

کد کنترل



578A

578

A

صبح جمعه  
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمرس) - سال ۱۳۹۸

### رشته علوم و مهندسی آب - هواسنایی کشاورزی (۲۴۳۰)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضیات (۱،۲،۳) - آمار و احتمالات - اقلیم‌شناسی در کشاورزی - هیدرومتبوروازی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرة منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای نهادی انتخابی خلبان و حقوقی آن سازمان مجاز نیست و با مخاطبان برای عبورات و فثار منع شود.

۱۳۹۸

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

-۱ در یک مثلث با قاعده ۱۵، ارتفاع وارد بر آن ۸ واحد است. خطی موازی قاعده با سرعت ثابت  $4^{\circ}/\text{س}$  واحد بر ثانیه از آن دور می‌شود و مساحت مثلث را رنگ می‌کند. سرعت افزایش مساحت رنگ شده در لحظه‌ای به فاصله ۳ واحد از قاعده، کدام است؟

- (۱)  $0/325$
- (۲)  $0/375$
- (۳)  $0/425$
- (۴)  $0/475$

-۲ مشتق مرتبه ششم تابع  $y = \frac{1}{x^2 - x - 2}$  به زای کدام است؟

- (۱)  $120 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6$
- (۲)  $-120 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6$
- (۳)  $-240 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7$
- (۴)  $-480 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7$

-۳ در بسط تابع  $y = \sin^7 x$  بر حسب توان‌های صعودی  $x$ ، ضریب  $x^8$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{8}{7!}$
- (۲)  $-\frac{8}{7!}$
- (۳)  $\frac{16}{7!}$
- (۴)  $-\frac{16}{7!}$

-۴ با استفاده از تعریف انتگرال معین، حاصل کدام است؟

- (۱)  $\frac{3}{n}$   
 (۲)  $\frac{2}{n}$   
 (۳)  $\frac{3}{2}$   
 (۴)  $\frac{3}{4}$

-۵ سطح همگن محدود به دایره  $x^2 + y^2 = 36$  و بیضی  $4x^2 + 9y^2 = 36$  واقع در ناحیه اول محورهای مختصات را در نظر بگیرید، فاصله مرکز نقل این سطح از محور y ها کدام است؟

- (۱)  $\frac{3}{\pi}$   
 (۲)  $\frac{4}{\pi}$   
 (۳)  $\frac{5}{\pi}$   
 (۴)  $\frac{10}{3\pi}$

-۶ معادله فتری به صورت  $\vec{r}(t) = 4 \cos t \vec{i} + 4 \sin t \vec{j} + 2t \vec{k}$  است. جرم مخصوص (چگالی) هر نقطه آن برابر  $\frac{1}{40}$  مربع فاصله آن نقطه تا مبدأ مختصات است. جرم فتر کدام است؟

- (۱)  $2\pi + 3\pi^2$   
 (۲)  $2\pi + 3\pi^3$   
 (۳)  $4\pi + 3\pi^2$   
 (۴)  $4\pi + 3\pi^3$

-۷ مساحت حلقه محدود به منحنی با معادله  $y^2 = x(x-1)$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{16}{15}$   
 (۲)  $\frac{14}{15}$   
 (۳)  $\frac{8}{15}$   
 (۴)  $\frac{7}{15}$

- ۸ خط مماس بر فصل مشترک دو رویه به معادلات  $2x^2 + y^2 + z^2 = 7$  و  $z = x^2 + y^2$  در نقطه  $(-1, 1, 2)$  صفحه  $xoy$  را با کدام مختصات قطع می‌کند؟
- (-۶, -۵, ۰) (۱)
  - (-۶, ۵, ۰) (۲)
  - (۳, -۴, ۰) (۳)
  - (-۴, ۳, ۰) (۴)
- ۹ بیشترین مقدار تابع  $u = xyz$  با شرط  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$  کدام است؟
- $\frac{4}{\sqrt{3}}$  (۱)
  - $\frac{3}{\sqrt{2}}$  (۲)
  - $\frac{2}{\sqrt{2}}$  (۳)
  - $\sqrt{3}$  (۴)
- ۱۰ حجم محدود به رویه  $z = x^2 + y^2$  و صفحه  $z = 4$  کدام است؟
- $2\pi$  (۱)
  - $4\pi$  (۲)
  - $6\pi$  (۳)
  - $8\pi$  (۴)
- ۱۱ حاصل انتگرال  $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$  در میدان  $4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$  کدام است؟
- $\frac{32}{3}\pi$  (۱)
  - $\frac{64}{3}\pi$  (۲)
  - $\frac{56}{5}\pi$  (۳)
  - $\frac{128}{5}\pi$  (۴)
- ۱۲ انتگرال  $\oint_C y dx - 2x dy$  بر روی بیضی  $C$  به معادله  $2x^2 + y^2 = 4$  کدام است؟
- $-6\sqrt{2}\pi$  (۱)
  - $-4\sqrt{2}\pi$  (۲)
  - $3\sqrt{2}\pi$  (۳)
  - $4\sqrt{2}\pi$  (۴)

- ۱۳- مساحت قسمتی از صفحه  $x^2 + 4y^2 = 1$  با استوانه بیضی  $2x - 2y + z = 4$  بریده شود، کدام است؟

$$\frac{3\pi}{2} \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{3} \quad (2)$$

$$\frac{4\pi}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3\pi}{4} \quad (4)$$

- ۱۴- اگر  $S$  سطح کره به مرکز مبدأ مختصات و شعاع ۱ واحد،  $\vec{F} = 5x\vec{i} - 2y\vec{j} + 3\vec{k}$  بردار نرمال خارجی سطح

$$\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad \text{کدام است؟}$$

$$\pi \quad (1)$$

$$2\pi \quad (2)$$

$$3\pi \quad (3)$$

$$4\pi \quad (4)$$

- ۱۵- اگر  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(r, \theta)}$  کدام است؟  $x = r \cos \theta$  و  $y = r \sin \theta$ ،  $v = xy$ ،  $u = x^2 - y^2$

$$4r^2 \quad (1)$$

$$4r^2 \quad (2)$$

$$2r^2 \quad (3)$$

$$2r^2 \quad (4)$$

- ۱۶- جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $y'' + 4y' + 5y = e^{-rx}$ ، کدام است؟

$$y = e^{-rx} \sin(rx + \alpha) + e^{-rx} \quad (1)$$

$$y = Ae^{-rx} \sin(x + \alpha) - e^{-rx} \quad (2)$$

$$y = Ae^{-rx} \sin(x + \alpha) + e^{-rx} \quad (3)$$

$$y = e^{rx} \sin(x + \alpha) - e^{-rx} \quad (4)$$

- ۱۷- جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $y' + y = y^2(\cos x - \sin x)$ ، کدام است؟

$$y(\sin x + ce^x) = 1 \quad (1)$$

$$y(-\sin x + ce^x) = 1 \quad (2)$$

$$y(-\cos x + ce^{-x}) = 1 \quad (3)$$

$$y(\cos x + ce^{-x}) = 1 \quad (4)$$

- ۱۸- اگر یکی از منحنی‌های جواب معادله دیفرانسیل  $x(3x+2y^2)dx+2y(1+x^2)dy=0$  از نقطه  $(-2,2)$  بگذرد، این منحنی محور  $x$  ها را با کدام طول قطع می‌کند؟

- $\sqrt{5}$  (۱)  
 $\sqrt{7}$  (۲)  
 $\sqrt[3]{8}$  (۳)  
 $\sqrt[3]{12}$  (۴)

- ۱۹- عامل انتگرال‌ساز معادله دیفرانسیل  $(xy^2+2y)dx+(xy^2+2y^2-4x)dy=0$ ، کدام است؟

- $\frac{x}{y}$  (۱)  
 $\frac{1}{y^2}$  (۲)  
 $\frac{1}{y^3}$  (۳)  
 $\frac{1}{x}$  (۴)

- ۲۰- جواب معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی  $px+qy=2(x^2+y^2)$  به کدام صورت است؟

$$\varphi(xy, \frac{z}{x^2+y^2}) = 0 \quad (1)$$

$$\varphi(xy, z(x^2+y^2)) = 0 \quad (2)$$

$$\varphi(\frac{x}{y}, x^2+y^2-z) = 0 \quad (3)$$

$$\varphi(\frac{x}{y}, \frac{x+y}{z^2}) = 0 \quad (4)$$

- ۲۱- از میان هیستوگرام‌های فراوانی مطلق و فراوانی نسبی کدام مورد مناسب‌تر است و دلیل آن کدام مورد می‌باشد؟

- (۱) هیستوگرام فراوانی نسبی - مساحت مستطیل‌ها مساوی  $N$  است.  
(۲) هیستوگرام فراوانی نسبی - مساحت مستطیل‌ها مساوی ۱ است.  
(۳) هیستوگرام فراوانی مطلق - مساحت مستطیل‌ها مساوی ۱ است.  
(۴) هیستوگرام فراوانی مطلق - مساحت مستطیل‌ها مساوی  $N$  است.

- ۲۲- میانگین حسابی دو عدد ۱۳ و میانگین هندسی آن‌ها ۱۲ است. مقادیر عددی  $x_1$  و  $x_2$  کدام است؟

- $x_2 = 17$  و  $x_1 = 7$  (۱)  
 $x_2 = 5$  و  $x_1 = 21$  (۲)  
 $x_2 = 11$  و  $x_1 = 15$  (۳)  
 $x_2 = 8$  و  $x_1 = 18$  (۴)

- ۲۳- هواپیمایی شامل ۲۵۰ مسافر است که متوسط وزن هر مسافر  $66\frac{8}{8}$  کیلوگرم می‌باشد. اگر متوسط وزن مسافران زن  $60$  کیلوگرم و مسافران مرد  $70$  کیلوگرم باشد، تعداد زنان و مردان در هواپیما به ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

- (۱)  $170 - 80$   
 (۲)  $150 - 100$   
 (۳)  $130 - 120$   
 (۴)  $125 - 125$

- ۲۴- اگر چارک سوم داده‌های یک نمونه برابر عدد  $x$  باشد، آنگاه کدام مورد درست است؟

- (۱)  $\frac{1}{3}$  داده‌های نمونه کوچک‌تر یا مساوی  $x$  است.  
 (۲)  $\frac{1}{3}$  داده‌های نمونه بزرگ‌تر یا مساوی  $x$  است.  
 (۳)  $\frac{1}{4}$  داده‌های نمونه کوچک‌تر یا مساوی  $x$  است.  
 (۴)  $\frac{1}{4}$  داده‌های نمونه بزرگ‌تر یا مساوی  $x$  است.

- ۲۵- میزان دبی آب یک رودخانه در چهار زمان متواتی  $25, 27, 25$  و  $5$  می‌باشد، متوسط دبی آب در طول دوره مذکور چقدر است؟

- (۱)  $11.6$   
 (۲)  $15$   
 (۳)  $18$   
 (۴)  $40/1$

- ۲۶- اگر  $a$  و  $b$  هر دو مقدار ثابت و  $x$  متغیر تصادفی باشند، آنگاه  $Var(a + bx)$  چقدر است؟

- (۱)  $b^2 Var(x)$   
 (۲)  $(a \pm b)Var(x)$   
 (۳)  $a \pm bVar(x)$   
 (۴)  $a + bVar(x)$

- ۲۷- رابطه (میانه - میانگین)  $\frac{1}{\sigma}$  کدام مورد را محاسبه می‌کند؟

- (۱) انحراف از میانه  
 (۲) چارک متوسط  
 (۳) کشیدگی  
 (۴) چولگی

- ۲۸- اگر  $A$  و  $B$  دو پیشامد مستقل باشند و  $P(A) = \frac{2}{10}$  و  $P(B) = \frac{7}{10}$  باشد، آنگاه  $P(B|A)$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{3}{8}$   
 (۲)  $\frac{5}{8}$   
 (۳)  $\frac{5}{10}$   
 (۴)  $\frac{8}{10}$

- ۲۹- در یک تاس، شانس آمدن هر وجهه متناسب با عدد روی آن وجه است. احتمال اینکه عدد مشاهده شده زوج باشد، چقدر است؟

- (۱)  $\frac{2}{7}$   
 (۲)  $\frac{3}{7}$   
 (۳)  $\frac{4}{7}$   
 (۴)  $\frac{5}{7}$

- ۳۰- چهار نفر در شهری که دارای دو بیمارستان است، به دنبال مریض خود می‌گردند. احتمال اینکه به صورت تصادفی دو نفر وارد یک بیمارستان و دو نفر دیگر وارد بیمارستان دیگر شوند، چقدر است؟

- (۱)  $\frac{1}{2}$   
 (۲)  $\frac{1}{4}$   
 (۳)  $\frac{1}{8}$   
 (۴)  $\frac{3}{8}$

- ۳۱- اگر در یک جامعه ۳۰ عضوی، میانگین و ضریب تغییرات عبارت  $x + 8 \times 10$  به ترتیب برابر با ۴۰ و ۴/۰ باشد، ضریب تغییرات متغیر  $x$  چند درصد است؟

- (۱) ۲۵  
 (۲) ۴۰  
 (۳) ۵۰  
 (۴) ۱۰۰

- ۳۲- اگر در یک کلاس آمار، نمرات دارای توزیع نرمال با میانگین ۱۲ و واریانس ۱۶ باشد، ۵٪ پایین کلاس حداقل دارای چه نمره‌ای هستند؟

- (۱) ۱/۹۶  
 (۲) ۲/۵۷  
 (۳) ۸  
 (۴) ۱۲

- ۳۳ - در جدول توزیع فراوانی زیر، چند درصد افراد دارای گروه خونی AB هستند؟

گروه خونی	فراوانی تجمعی
A	۹
B	۲۳
AB	۳۴
O	۵۰

- ۱۸ (۱)  
۲۲ (۲)  
۲۸ (۳)  
۳۲ (۴)

- ۳۴ - اگر  $S_p^2 = ۵۱$  ،  $S_1^2 = ۷۹$  ،  $S_2^2 = ۷۱$  ،  $n_1 = ۷$  و  $n_2 = ۹$  باشد، مقدار  $S_p^2$  برابر کدام است؟

- ۷۱/۷۵ (۱)  
۶۷ (۲)  
۶۶/۷۵ (۳)  
۷۶ (۴)

- ۳۵ - نسبت دو متغیر مستقل با توزیع کای اسکوئر به درجه آزادی آن‌ها برابر کدام آماره است؟

- Z (۲) t (۱)  
 $\chi^2$  (۴) F (۳)

- ۳۶ - برای آزمون  $H_0 : p = ۰/۲$ ، نمونه‌ای تصادفی شامل ۱۰۰ گیاه انتخاب و ۳۰ بوته مبتلا به آفت بخصوصی هستند. مقدار آماره آزمون چقدر است؟

- ۲ (۱)  
۲/۵ (۲)  
-۷/۵ (۳)  
۶۲/۵ (۴)

- ۳۷ -  $R^2$  تصحیح شده کدام است؟

- $1 - (1 - R^2) \left( \frac{n-1}{n-p} \right)$  (۱)  
 $1 - (1 - R^2) \left( \frac{n-p}{n-1} \right)$  (۲)  
 $1 - (1 + R^2) \left( \frac{n-1}{n-p} \right)$  (۳)  
 $1 - (1 + R^2) \left( \frac{n-p}{n-1} \right)$  (۴)

- ۳۸- اگر  $S^2$ , برآورد واریانس جامعه باشد، آزمون  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ , در کدام مورد معنی‌دار است؟

(۱) اگر  $\chi^2 \geq \chi_{\alpha, (n-1)}^2$  محاسبه شده باشد.

(۲) اگر  $\chi^2 \geq \chi_{(1-\frac{\alpha}{2}), (n-1)}^2$  محاسبه شده باشد.

(۳) اگر  $\chi^2 \leq \chi_{(1-\alpha), (n-2)}^2$  محاسبه شده باشد.

(۴) اگر  $\chi^2 \leq \chi_{\alpha, (n-2)}^2$  محاسبه شده باشد.

- ۳۹- در یک مستله رگرسیون خطی ساده،  $\bar{x} = 1/5$  و  $\hat{\beta} = 1/4$  از روش LSE برآورده شده است. برآورد  $\alpha$  در ادامه همان روش کدام است؟

(۱) ۱/۸

(۲) ۲/۱

(۳) ۲/۵

(۴) ۰/۳

- ۴۰- با فرض  $S = ۲۵۰$  و  $n = ۲۵$  و  $\bar{x} = ۱۶۳$  و  $\mu = ۱۵۰۰$ ، مقدار  $P$  تقریبی در آزمون  $H_0: \mu = ۱۵۰۰$  رد شده باشد، چقدر است؟

(اگر  $t_{0.05, 24} = ۲.۷۹۷$  ،  $t_{0.02, 24} = ۲.۴۹۲$  ،  $t_{0.01, 24} = ۲.۰۶۴$  ،  $t_{0.005, 24} = ۱.۷۱۱$  باشد).

(۱) ۰/۰۱

(۲) ۰/۰۲

(۳) ۰/۰۵

(۴) ۰/۱۰

- ۴۱- کدام مورد از محدودیت‌های روش کلاسیک درجه - روز رشد نمی‌باشد؟

(۱) تأثیر مستقیم دما بر نمو

(۲)

فرض خطی بودن نمو بر حسب دما

(۳) لحاظ شدن اثر تنش‌های محیطی بر نمو

(۴) لحاظ شدن اثر دماهای کاردینال (آستانه‌ها)

- ۴۲- از دیدگاه اقلیم‌شناسی کشاورزی، کدام مورد درست است؟

(۱) بزرگترین تفاوت در دمای شبیه‌های جنوبی و شمالی در زمستان ایجاد می‌شود.

(۲) تأثیر شبیب بر تابش دریافتی در قطبین بیشتر از عرض‌های جغرافیایی متوسط است.

(۳) در فصل بهار، شبیه‌های جنوبی به کندی گرم می‌شوند ولی شبیب شمالی سردر است.

(۴) در نیم‌کره شمالی در عرض‌های متوسط شبیه‌های جنوبی تابش بیشتری نسبت به شبیه‌های شمالی دریافت می‌کنند.

- ۴۳- اثر فتوپریودیسم بر نمو گیاه، در کدام مورد قابل اغماض است؟

(۱) ارقام گیاهی روز کوتاه

(۲) ارقام گیاهی روز بلند

(۳) در فصولی با ابرناکی اندک

(۴) در دوره‌هایی با ابرناکی زیاد

- ۴۴- کدام عامل به عنوان مؤلفه اولیه کننده اقلیم محسوب نمی‌شود؟

(۱) جریانات اقیانوسی

(۲) طول جغرافیایی

(۳) عرض جغرافیایی

(۴) ارتفاع

- ۴۵- اگر سرعت (نرخ) نمو یک گیاه به فرم کلی  $DR = aT + bP$  که در آن  $T$ : متوسط دمای هوا و  $P$ : فتوپریود می‌باشد بیان شود، دمای پایه (base) کدام است؟

$$\frac{-a}{b} \quad (1)$$

$$\frac{a}{b} \quad (2)$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)P \quad (3)$$

$$\left(\frac{-b}{a}\right)(P) \quad (4)$$

- ۴۶- کدام مورد در ضریب اقلیمی بارات (Barat) مدنظر نمی‌باشد؟

(۲) تبخیر سالانه

(۱) ضریب رواناب

(۴) متوسط بارندگی سالانه

(۳) میانگین دمای سالانه

- ۴۷- در ضریب هیدروترمیک سیلیانینف، کدام کمیت بارندگی مدنظر است؟

(۲) بارندگی دوره رشد گیاه

(۱) میانگین ماهانه بارندگی

(۳) بارندگی دوره‌ای با دمای متوسط بیش از  $10^{\circ}\text{C}$

(۴) میانگین بارش ماههایی با متوسط دمای  $10^{\circ}\text{C}$  و بیشتر

- ۴۸- در مورد پیامدهای تغییر اقلیم بر فرایندهای گیاهی، کدام مورد درست است؟

(۱) در عرض‌های جغرافیایی پایین، گرم شدن دمای زمین باعث تسریع جوانهزنی ذرت می‌شود.

(۲) گرمایش جهانی در مناطق معتدله باعث افزایش سرعت نمو گیاه ذرت می‌شود.

(۳) هدایت روزنای گیاهان  $C_4$  با افزایش غلظت  $\text{CO}_2$  افزایش می‌یابد.

(۴) با دو برابر شدن غلظت  $\text{CO}_2$ ، هدایت روزنای گندم افزایش می‌یابد.

- ۴۹- براساس یافته‌های معتبر علمی، متوسط تغییرات دمای کره زمین بر اثر تغییر اقلیم چقدر است و بیشترین افزایش در کدام مناطق رخ داده است؟

(۲)  $5^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{C}$ ، عرض میانی

(۱)  $5^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{C}$ ، قطبین زمین

(۴)  $8^{\circ}\text{C}/8^{\circ}\text{C}$ ، عرض‌های جغرافیایی بالا

(۳)  $8^{\circ}\text{C}/8^{\circ}\text{C}$ ، مناطق استوایی

- ۵۰- برای ارزیابی تنش گرمایی بر دام‌ها از کدام شاخص استفاده می‌شود و محدوده تغییرات کاربردی آن کدام است؟ (دما ( $^{\circ}\text{F}$ ))

(۲)  $70-90^{\circ}\text{F}$ , THI

(۱)  $60-80^{\circ}\text{F}$ , THI

(۴)  $60-110^{\circ}\text{F}$ , HI

(۳)  $50-140^{\circ}\text{F}$ , HI

- ۵۱- کدام مورد درباره نمودار اقلیمی هایترگراف درست است؟

(۱) طویل بودن آن نشانه تغییرات زیاد درجه حرارت است.

(۲) عریض بودن آن نشان دهنده تغییرات زیاد بارندگی است.

(۳) عریض بودن آن نشان دهنده تغییرات زیاد درجه حرارت است.

(۴) طویل بودن آن نشانه تغییرات کم بارندگی در طول سال است.

- ۵۲- طبقه‌بندی اقلیمی تورنت وايت، کدام عامل‌ها را در نظر می‌گیرد؟

(۲) تبخیر و باد

(۱) تبخیر و باد

(۴) عرضه آب و بارش

(۳) عرضه آب و بارش

- ۵۳- در ضریب بارش آمپرژه به فرم کلی  $\frac{2000P}{M^2 - m^2}$  معرف کدام مورد می‌باشد؟

۱) بارش سالانه (میلی‌متر) - متوسط حداقل‌های مطلق ( $^{\circ}\text{C}$ )

۲) بارش سالانه (میلی‌متر) - دمای کمینه سردترین ماه سال ( $^{\circ}\text{K}$ )

۳) بارش سالانه (میلی‌متر) - میانگین دمای سردترین ماه سال ( $^{\circ}\text{C}$ )

۴) بارش سالانه (اینج) - حداقل مطلق در سردترین ماه سال ( $^{\circ}\text{K}$ )

- ۵۴- عملکرد کدام سامانه جوی، بیانگر گرم و خشک بودن و همچنین کم بارش و کم ابر بودن کشور ایران با میانگین‌های جهانی است؟

۱) نقش کم‌فشار حرارتی سودان

۱) استقرار در منطقه جنوب حاره

۴) نزدیکی به صحراي آفریقا

۳) مجاورت با پرفشار عربستان

- ۵۵- در طبقه‌بندی اقلیم کشاورزی سلیانینوف، کدام معیارهای دمایی برای تعیین کمربندهای حرارتی کره زمین استفاده شده است؟

۲) میانگین دما در گرم‌ترین ماه سال

۱) میانگین دمای سالانه

۴) هر سه مورد

۳) میانگین دما در سردترین ماه سال

- ۵۶- درجه بهره‌وری اقلیم (Climate's degree of productivity) وابسته به چه عواملی است؟

۱) میانگین سالانه دما و بارش

۲) مجموع بارش و تبخیر - تعرق پتانسیل

۳) مجموع دمای مؤثر بیش از  $10^{\circ}\text{C}$  سلسیوس و بارش

۴) مجموع دمای مؤثر بیش از صفر درجه و بارش

- ۵۷- در محاسبه زمان هلیوترومال از کدام پارامترها استفاده می‌شود؟

۱) دمای مؤثر - طول روز

۱) دمای مؤثر - طول روز

۴) دمای مؤثر - شدت تابش خورشید

۳) دمای مؤثر - شدت تابش خورشید

- ۵۸- کدام نسبت، برای بیان استحکام ساختار فضایی یک متغیر اقلیمی در نمودار نیم تغییر نما به کار می‌رود؟

Partial sill / sill (۲)

Nugget / sill (۱)

Partial sill / Range (۴)

Nugget / Range (۳)

- ۵۹- کدام سیگنال بزرگ مقیاس اقلیمی در نتیجه اختلاف فشار بین ایسلند و آزورس ایجاد می‌شود و تأثیر تعیین‌کننده بر اقلیم اروپا و آمریکای شمالی دارد؟

AO (۴)

NAO (۳)

PDO (۲)

ENSO (۱)

- ۶۰- فرم تابع ریاضی تغییرات بارندگی - ارتفاع در سواحل خزر چگونه است؟

۱) تابع خطی درجه ۱

۱) تابع غیرخطی

۴) تابع خطی درجه ۳


۳) تابع خطی درجه ۲

- ۶۱- اگر در یک منطقه، مقادیر بارش سالانه از توزیع نرمال تبعیت کند، برای تعیین بارش با دوره بازگشت ۲ سال و با توجه به معادله  $x = \bar{x} + k.s$ ، مقدار  $k$  چه عددی می‌تواند باشد؟


- +۱ (۱)
- +۲ (۲)
- ۱ (۳)
- ۰ (۴) صفر

- ۶۲- در تفیگرام زیر، در صورت وجود ابرناکی، ضخامت ابر حدود چند کیلومتر است؟

- ۰/۵ (۱)
- ۵ (۲)
- ۵۰ (۳)
- ۴) ابرناکی وجود ندارد.



- ۶۳- کدام نمودار، تغییرات چگالی برف را با دمای هوای سطحی نشان می‌دهد؟



- ۶۴- در حوضه آبریزی، نرمال بارندگی فصلی نسبتاً کم و بهمیزان ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. فراوان‌ترین تداوم بارندگی در منطقه، تداوم دو روزه آن بوده است. مقدار آستانه بارندگی رگبار جهت انتخاب رگبار طرح چند سانتی‌متر است؟

- ۳ (۱)
- ۶ (۲)
- ۱۲ (۳)
- ۶۰ (۴)

۶۵- فرض کنید ۱۵ سال آمار بارندگی به صورت جدول زیر وجود دارد که بسته به آستانه خشکسالی مفروض ( $X_0$ ), هر کدام از سال‌ها وضعیت مرطوب (W)، نرمال (N) یا خشک (D) دارد. احتمال رسیدن از حالت (D) به حالت اقلیمی (W) چقدر است؟

زمان (t) (s)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
حال (s)	W	W	D	D	D	N	N	W	N	N	D	D	W	W	W

- ۱) ۰/۲
- ۲) ۰/۳
- ۳) ۰/۶
- ۴) ۰/۸

۶۶- براساس اطلاعات جدول زیر، از دمای چند درجه سانتی‌گراد برای تخمین حداکثر بارش محتمل (PMP) استفاده می‌شود؟

۱۸	۱۲	۰۶	۰۰	۱۸	۱۲	۰۶	۰۰	زمان(ساعت)
۲۱	۲۰	۲۴	۲۶	۲۴	۲۳	۲۲	۲۲	نقطه شنیم (°C)

- ۱) ۲۰
- ۲) ۲۲
- ۳) ۲۳
- ۴) ۲۴

۶۷- کدام مورد، جابجایی رگبار (Storm Transposition) در مطالعات هیدرومئورولوژی است؟

- ۱) تغییر مسیر جبهه باران‌زا
- ۲) تعمیم داده‌های مشاهداتی به مناطق فاقد داده
- ۳) فرایند حرکت توده هوای باران‌زا به ارتفاع بالاتر
- ۴) انتقال فرضی یک رگبار از محل وقوع به یک محل مفروض دیگر

۶۸- مهم‌ترین عامل خطأ در سنجش پوشش برف با ماهواره‌های اپتیکال (Optical) کدام مورد است؟

- ۱) رطوبت جو
- ۲) ذرات معلق
- ۳) پوشش ابر
- ۴) آلبیدوی برف

۶۹- در مورد متوسط ارتفاع خط برف (Snow Line) کدام مورد درست است؟

- ۱) خط برف در اقلیم خشک پایین‌تر از اقلیم مرطوب است.
- ۲) ارتفاع خط برف در مناطق استوایی همواره کمتر از عرض‌های میانی است.
- ۳) در نیمکره شمالی عموماً ارتفاع خط برف در دامنه‌های رو به استوا بیشتر است.
- ۴) در هر عرض جغرافیایی مفروض، خط برف در نیمکره جنوبی بالاتر از نیمکره شمالی است.

۷۰- از کدام تکنیک آماری، برای تولید داده‌های بارندگی روزانه نمی‌توان استفاده کرد؟

- ۱) سری فوریه
- ۲) رگرسیون شرطی
- ۳) هیستوگرام داده‌ها
- ۴) زنجیره مارکف - توزیع احتمال

- ۷۱- معادله اتورگرسیو برآورد رواناب بارش در زمان  $t$  از روی رواناب زمان  $t-1$  و بارش زمان  $t$  به صورت  $Z_t = \alpha/4 Z_{t-1} + \beta/2 Y_t + \varepsilon_t$  به دست آمده است. اگر  $Z_t = 1/1$ ,  $Y_{t+1} = 1/8$  و  $\varepsilon_t = 0/7$  باشد، مقدار  $\alpha$  چقدر است؟
- (۱)  $0/4$
  - (۲)  $0/8$
  - (۳)  $1/0$
  - (۴)  $1/5$
- ۷۲- میانگین و انحراف معیار بارش در یک حوضه آبریز به مساحت  $100$  کیلومتر مربع به ترتیب  $76^{\circ}$  و  $198/1$  میلی‌متر است. اگر خطای مجاز در برآورد بارش  $10$  درصد باشد، تراکم بهینه ایستگاه‌ها در حوضه چند کیلومتر مربع بر ایستگاه است؟
- (۱)  $5$
  - (۲)  $7$
  - (۳)  $9/8$
  - (۴)  $14/7$
- ۷۳- جذب طیف رادار توسط بخش مخلوط مایع و یخ ابر منجر به کدام خطای راداری می‌شود؟
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Permanent Echo (۲)        | Bright Band (۱)      |
| Anomalous Propagation (۴) | Beam Attenuation (۳) |
- ۷۴- اگر کل گرمای ورودی به یک توده برف در طی یک روز  $640$  کالری بر سانتی‌متر مربع و کیفیت حرارتی برف  $8/0$  باشد، مقدار ذوب برف چند سانتی‌متر است؟
- (۱)  $1$
  - (۲)  $5$
  - (۳)  $8$
  - (۴)  $10$
- ۷۵-  $70$  درصد مقدار بارش در  $30$  درصد اولیه زمان بارش اتفاق می‌افتد، بارش مذکور از کدام چارک است؟
- (۱) اول
  - (۲) دوم
  - (۳) سوم
  - (۴) چهارم
- ۷۶- اگر آب قابل بارش یک ستون هوا از رابطه  $W \equiv -\frac{1}{g} \int_{P_z}^{P_z+dz} q dP$  محاسبه شود، در این رابطه،  $q$  و واحد آن در کدام مورد به درستی معرفی شده است؟
- (۱) رطوبت نسبی - درصد
  - (۲) نم ویژه - گرم بر کیلوگرم
  - (۳) نم مطلق - گرم بر متر مکعب
  - (۴) نسبت اختلاط - کیلوگرم بر کیلوگرم
- ۷۷- افزایش دمای کره زمین، سبب کاهش کدام پارامتر می‌شود؟
- (۱) بارش
  - (۲) تبخیر - تعرق
  - (۳) پوشش برفی
  - (۴) دوره‌های خشک

- ۷۸- کدام شاخص برای پایش خشکسالی در ایران مناسب‌تر است؟
- (۱) درصد نرمال بارش
  - (۲) دهک‌های بارش
  - (۳) بارش استاندارد
  - (۴) بارش - تبخیر و تعرق استاندارد
- ۷۹- اگر ورودی به سیستم  $x(n) = 1, 3, 2, 0, 3$  و پاسخ ضربه واحد برابر  $h(n) = 1, 3, 2, 0$  باشد، مقدار خروجی مدل تابع انتقال کدام است؟
- (۱) ۹, ۲۷, ۱۸, ۰, ۰, ۰
  - (۲) ۱, ۶, ۱۳, ۱۳, ۶, ۰, ۰
  - (۳) ۱, ۶, ۱۳, ۱۲, ۷, ۹, ۶, ۰
  - (۴) ۲۷, ۹, ۱۸, ۰, ۰, ۰, ۰
- ۸۰- کدام مورد درست است؟
- (۱) شدت بارندگی مستقل از دوره بازگشت آن است.
  - (۲) شدت بارندگی با زمان تداوم آن رابطه مستقیم دارد.
  - (۳) معمولاً شدت بارندگی مستقل از زمان تداوم آن است.
  - (۴) هرچه شدت بارندگی بیشتر باشد، دوره بازگشت آن طولانی‌تر است.