

۵۱۴

۵۱۴

A

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

دفترچه شماره ۱

صبح جمعه
۹۲/۱۱/۱۸اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۳

مجموعه شیمی - کد ۱۲۰۳

مدت پاسخگویی: ۲۱۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	شیمی آلی	۳۰	۳۱	۶۰
۳	شیمی معدنی	۳۰	۶۱	۹۰
۴	شیمی تجزیه	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	شیمی فیزیک	۳۰	۱۲۱	۱۵۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر عقوبات رفتار می شود.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- The two groups of students should be taught differently in that their learning needs are quite _____.
 1) bizarre 2) distinct 3) stable 4) reckless
- 2- This mildly picaresque novel _____ a boy's flight from prep school to an eventful weekend in a big city.
 1) recounts 2) accumulates 3) asserts 4) restricts
- 3- The two companies worked in _____ and lowered their prices to make their rival company collapse.
 1) ambivalence 2) validity 3) chaos 4) collusion
- 4- The U.S. was accused of _____ international efforts to combat global warming.
 1) regretting 2) convicting 3) undermining 4) accelerating
- 5- Richard is so _____ that his diet consists almost exclusively of catfish and chicken liver—the two most inexpensive foods in the store.
 1) frugal 2) timid 3) selective 4) astute
- 6- Even after traveling 62 miles, the _____ runner kept on moving.
 1) congenial 2) indefatigable 3) flimsy 4) indifferent
- 7- As we traveled to college for the first time, the family car was laden with books, clothing, _____, and other necessities.
 1) warehouses 2) amenities 3) fragments 4) appliances
- 8- When Eileen _____ me to a fight, I could see the hatred in her eyes.
 1) strengthened 2) derived 3) challenged 4) justified
- 9- People like to be around George because he is so _____ and good-natured, so it comes as no surprise that he has so many good friends.
 1) affable 2) sarcastic 3) superficial 4) half-hearted
- 10- The new tax policy was criticized in that it was argued that the rich were actually the main _____ of the tax cuts.
 1) hedonists 2) savants 3) benefactors 4) beneficiaries

Part B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Quantum teleportation exploits some of the most basic (and peculiar) features of quantum mechanics, (11) _____ in the first quarter of the 20th century to explain (12) _____ at the level of individual atoms. (13) _____ the beginning, theorists realized that quantum physics led to a plethora of new phenomena, (14) _____ defy common sense. Technological progress in the final quarter of the 20th century has enabled researchers to conduct many experiments that not only demonstrate fundamental, sometimes bizarre aspects of quantum mechanics but, (15) _____ in the case of quantum teleportation, apply them to achieve previously inconceivable feats.



- 11- 1) invented a branch of physics
 3) a branch of physics was invented 2) a branch of physics invented
 4) that invented a branch of physics
- 12- 1) occurrence in processes
 3) processes that occur 2) that processes that occur
 4) processes of occurrence
- 13- 1) Since 2) Of 3) From 4) For
- 14- 1) some of which 2) some of them 3) some of those 4) of them some
- 15- 1) also 2) as 3) like 4) such a

Directions: Read the following three passages and select the best choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each question. Then mark your answer on your answer sheet.

Passage 1:

Neutral complexes are usually only sparingly soluble in water, but are often readily soluble in organic solvents. For example, the red complex $[\text{Fe}(\text{acac})_3]$ (Hacac is the abbreviation for acetylacetone, the systematic name for which is pentane-2,4-dione) can be extracted from aqueous solution into benzene or chloroform, and the formation of $[\text{Fe}(\text{acac})_3]$ is used as a means of extracting Fe(III) from aqueous solution. Pentane-2,4-dione is a β -diketone and deprotonation gives $[\text{acac}]^-$, a β -diketonate.

The formation of $[\text{Fe}(\text{acac})_3]$ in aqueous solution involves equilibria (1) and (2).



The amount of complex formed depends on the pH of the solution. If the pH is too low, H⁺ ions compete with Fe³⁺ ions for the ligand (i.e. the back reaction 1 competes with the forward reaction 2). If the pH is too high, Fe(III) is precipitated as Fe(OH)₃ for which $K_{sp} = 2.64 \times 10^{-39}$. Thus, there is an optimum pH for the extraction of Fe(III) from aqueous media using Hacac and a given organic solvent (e.g. CHCl₃). Although ligands are defined as being Lewis bases, most are also Brønsted bases, and accurate pH control is of great importance in studies of complex formation. Solvent extraction is important in the analytical and industrial separation of many metals.

Passage 2:

Copper is an economically important element but it is found in only trace quantities (global average abundance is $63 \mu\text{gg}^{-1}$) in the Earth's crust. For both plants and animals copper is required as a trace nutrient, but excessive amounts are toxic. Mineral forms include the free metal, a number of silicate and oxide species, and mixed copper/iron sulfide minerals such as chalcopyrite (CuFeS_2). The principal oxidation state of copper in the hydrosphere is the +2 state. Monovalent copper species are also known but they dissociate to form copper (0) and copper (II) in most instances. An exception is in sea water where, under reducing conditions, copper (I) chloro species are stable.

Copper is a borderline metal and therefore has a good ability to form complexes with a variety of ligands. Ligands with nitrogen donor atoms are specially favored. In natural fresh water that is in equilibrium with the atmosphere, the aquo complex of copper is the principal species at low pH. In the neutral pH range, partially deprotonated forms become important as does a complex with hydrogen carbonate. At still higher pH values, further deprotonation takes place and a complex involving two carbonate ions is formed.

20- According to the passage, which of the following statements is true?

- 1) Copper has little importance in the economy.
- 2) Plants and animals require excessive amounts of copper.
- 3) Copper is a relatively abundant element in the Earth's crust.
- 4) Trace amounts of copper are required for our body.

21- Which of the following species is NOT likely to be found in mines?

- 1) CuO
- 2) CuCl
- 3) Cu
- 4) CuSiO_3

22- What usually happens to Cu (I) species in the hydrosphere?

- 1) They form complexes with a variety of ligands.
- 2) They react with FeS_2 to produce CuFeS_2 .
- 3) They dissociate to Cu (0) and Cu (II) species.
- 4) They are stable under oxidizing conditions.

23- Which of the following species is the partially deprotonated form of copper aquo complex?

- 1) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- 2) $[\text{Cu}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5]^+$
- 3) $\text{Cu}(\text{HCO}_3)_2$
- 4) CuFeS_2


24- The word "nutrient" in line 3 is closest in meaning to -----.

- 1) impurity
- 2) metal
- 3) inert
- 4) food supplement

Passage 3.

Iodine is a weak oxidizing agent used primarily for the determination of strong reductants. The most accurate description of the half-reaction for iodine is: $\text{I}_3^- + 2\text{e}^- \rightarrow 3\text{I}^- (E^0 = 0.536 \text{ V})$ where I_3^- is the triiodide ion. Because of the relatively small electrode potential, standard iodine solutions have relatively limited applications compared with several other oxidants. Occasionally, however, this low potential is advantageous because it imparts a degree of selectivity that makes possible the determination of strong reducing agents in the presence of weak ones. An important advantage of iodine is the availability of a sensitive and reversible indicator for the titrations. Iodine solutions lack stability, however, and must be standardized regularly.

Iodine (I_2) is not very soluble in water (0.001 M). To obtain solutions having analytically useful concentrations of the element, iodine is ordinarily dissolved in moderately concentrated solutions of potassium iodide. In this medium, iodine is reasonably soluble as a consequence of the reaction




Iodine dissolves only very slowly in solutions of potassium iodide, particularly if the iodide concentration is low. To ensure complete solution, the iodine is always dissolved in a small volume of concentrated potassium iodide, care being taken to avoid dilution of the concentrated solution until the last trace of solid iodine has disappeared. Otherwise, the molarity of the diluted solution gradually increases with time. This problem can be avoided by filtering the solution through a sintered glass crucible before standardization.

Iodine solutions lack stability for several reasons, one being the volatility of the solute. Losses of iodine from an open vessel occur at relatively short time even in the presence of an excess of iodide ion. In addition, iodine slowly attacks most organic materials. Consequently, cork or rubber stoppers are never used to close containers of the reagent, and precautions must be taken to protect standard solutions from contact with organic dusts. Air oxidation of iodide ion also causes changes in the molarity of an iodine solution: $4I^- + O_2 + 4H^+ \rightarrow 2I_2 + 2H_2O$. In contrast to the other effects, this reaction causes the molarity of the iodine to increase. Air oxidation is promoted by acids, heat, and light.

- 25-** According to the passage, what is the advantage of the small electrode potential of iodine?
- 1) It has a degree of selectivity towards reducing agents
 - 2) It is the limiting reagent in titrations
 - 3) It can oxidize almost all reducing agents
 - 4) It reacts with air during the titration
- 26-** Which of the following is a disadvantage of the iodine solution as an oxidizing agent?
- 1) Its indicator is reversible
 - 2) It has a sensitive indicator
 - 3) It is not very stable
 - 4) It has no selectivity
- 27-** It is necessary to use potassium iodide for titrations with iodine, because
- 1) it is a reducing agent.
 - 2) the solubility of iodine in pure water is low
 - 3) all species in the half-reaction should be present before titration
 - 4) neutral iodine atoms should be produced before titration
- 28-** What is the purpose of filtering the solution of $I_3^-(aq)$ through a sintered glass crucible?
- 1) To make sure that no excess $I^-(aq)$ is present in the final solution
 - 2) To make the solution more concentrated
 - 3) To make sure that no $I_2(s)$ is present at the bottom of the final solution
 - 4) To avoid dissociation of $I_3^-(aq)$ to $I_2(s)$ and $I^-(aq)$
- 29-** Which is the following does NOT cause the molarity of a standardized iodine solution to change?
- 1) evaporation of $I_2(aq)$ from solution
 - 2) the presence of iodide ion in excess
 - 3) reaction of iodine with organic materials
 - 4) reaction of iodine with air
- 30-** The word “stopper” in line 4 of the last paragraph is closest in meaning to -----.
- 1) lid
 - 2) brake
 - 3) tap
 - 4) surface

نام IUPAC مولکول زیر کدام است؟

-۳۱



- (۲) ۷، ۷ - دی متیل بی سیکو [۱،۲،۲] هپتا - ۲ - ان
 (۴) ۵، ۵ - دی متیل بی سیکو [۱،۲،۲] هپتا - ۵ - ان

- (۱) ۷، ۷ - دی متیل بی سیکو [۱،۲،۲] هپتا - ۵ - ان
 (۳) ۵، ۵ - دی متیل بی سیکو [۱،۲،۲] هپتا - ۲ - ان

کدام گزینه در مورد دو ترکیب A و B صحیح است؟


-۳۲



- (۱) ترکیب A و B فقط در واکنش S_N2 شرکت می‌کنند.
 (۲) ترکیب A و B فقط در واکنش S_N1 شرکت می‌کنند.
 (۳) ترکیب A فقط در واکنش S_N2 و ترکیب B فقط در واکنش S_N1 شرکت می‌کند.
 (۴) ترکیب A فقط در واکنش S_N1 و ترکیب B فقط در واکنش S_N2 شرکت می‌کند.


کدام حلal برای افزایش سرعت واکنش زیر مناسب‌تر است؟

-۳۳



مناسب‌ترین کاتالیزور انتقال فاز برای واکنش زیر کدام است؟

-۳۴



واکنش کلردار کردن متان دارای سرعت و انتخاب پذیری می‌باشد، و واکنش برمدار کردن متان دارای سرعت و انتخاب پذیری است.

- (۲) پایین - بالا - پایین - بالا - بالا

- (۴) بالا - پایین - پایین - بالا

- (۱) پایین - بالا - بالا - پایین

- (۳) بالا - بالا - پایین - پایین

نسبت دو ساختار زیر چگونه است؟

-۳۶




(۲) یک جفت انانتیومرند

(۴) یکسان‌اند



(۱) ایزومر هندسی‌اند

(۳) یک جفت صورت بندی‌اند (conformer)


محصول واکنش زیر کدام است؟ -۳۷



محصول واکنش زیر کدام است؟ -۳۸




محصول واکنش زیر کدام است؟ -۳۹




محصول واکنش زیر کدام است؟

-۴۰




محصول نهایی واکنش زیر کدام است؟

-۴۱




محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟

-۴۲




محصول نهایی واکنش حرارتی زیر کدام است؟

-۴۳




محصول واکنش زیر کدام است؟

-۴۴




محصول واکنش زیر کدام است؟

-۴۵

در واکنش با NaNH_2 کدام مولکول فقط یک حد واسط بنزاین تشکیل می‌دهد؟

-۴۶



رشته مکمل قطعه ۵'-ACGT-۳' کدام قطعه می‌باشد؟

-۴۷

3'-TGCA-5' (۲)


3'-CGAT-5' (۱)

3'-TCAG-5' (۴)

3'-TACG-5' (۳)

کدام آldوز پس از کاهش توسط NaBH_4 ترکیب فعال نوری می‌دهند؟

-۴۸





C و B (۲)

C (۱)





D و C و B و A (۴)

A و D (۳)

-۴۹ طیف زیر با کدام ساختار مطابقت دارد؟




-۵۰ با توجه به طیف زیر برای ترکیب A کدام گزینه برای ثابت کویلاز (J) و جایه جایی شیمیابی صحیح است؟




نوآرایی مک لافرتی در طیف جرمی در کدام مولکول انجام نمی‌شود؟

-۵۱



ترکیب صحیح فرکانس ارتعاش کششی C-H در مولکول‌های زیر کدام است؟

-۵۲



A>B>D>C (۲)


D>C>B>A (۴)

A>B>C>D (۱)

D>A>B>C (۳)


سیستم اسپینی ایزومرهای دی‌کلروسیکلو پروپان در $^1\text{H NMR}$ عبارت است از:

-۵۳

A:ABX_۲ B:A_۲X_۲ C:A_۲ (۲)A:ABX_۲ B:A_۲X_۲ C:AA'XX' (۴)A:AA'XX' B:AA'XX' C:A_۲ (۱)A:ABX_۲ B:ABX_۲ C:A_۲B_۲ (۳)

کدام گزینه در مورد دو ترکیب زیر صحیح است؟

-۵۴



(۲) دمای ذوب A بیشتر و آنیدرید تشکیل نمی‌دهد.


(۱) دمای ذوب A بیشتر و آنیدرید تشکیل می‌دهد.

(۴) دمای ذوب B بیشتر و آنیدرید تشکیل نمی‌دهد.


(۳) دمای ذوب B بیشتر و آنیدرید تشکیل می‌دهد.

محصول واکنش زیر کدام است؟


-۵۵




-۵۶ محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟



-۵۷ کدام یک از ترکیب‌های زیر هموآروماتیک است؟




-۵۸ کدام اربیتال مولکولی Ψ_{NBMO} است؟




کدام الگو در مورد ساختار اربیتال مولکولی «سیکلو بوتادی ان» صحیح است؟

-۵۹



ترتیب افزایش سرعت حلal کافت (سلولیز) در ترکیب‌های زیر کدام است؟

-۶۰



-۶۱

تعداد گره‌های شعاعی و تعداد گره‌های زاویه‌ای برای اوربیتالی با اعداد کوانتموی $n = 2$ و $l = 1$ از راست به چپ عبارتد از:

- (۱) ۲ و ۱ (۲) ۱ و ۲
 (۳) ۴ و ۳ (۴) ۳ و ۱


-۶۲

اگر جمله طیفی برای یک یون فلز واسطه که آرایش الکترونی آن بیش از نیمه پر است برابر با $y F_x^y$ و تعداد ریز حالت‌های آن برابر ۱ باشد، مقادیر y و x کدام است؟

- $x = 5$ و $y = 3$ (۲) $x = 4/5$ و $y = 2$ (۱)
 $x = 5$ و $y = 5$ (۴) $x = 4/5$ و $y = 4$ (۳)

-۶۳

مجموعه جمله‌های طیفی زیر مربوط به یک آرایش الکترونی معین نماینده چند حالت ریز است؟



- ۶۰ (۲) ۴۵ (۱)
 ۱۲۰ (۴) ۸۰ (۳)


کدام گونه پایدارتر است؟

- F_2^+ (۲) I_2^+ (۱)
 Br_2^+ (۴) Cl_2^+ (۳)

-۶۵

بار قراردادی و همچنین عدد اکسایش اتم نیتروژنی که با ستاره مشخص شده است به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) صفر و +۲
 (۲) صفر و +۳
 (۳) -۱ و +۳
 (۴) +۱ و +۳



-۶۶

در کدام گزینه گونه‌های شیمیابی داده شده همگی به صورت خطی هستند؟

- SO_2 و ICl_2^- , N_2O , NO_2 (۲) I_2^- و NO_2^+ , O_2 , CO_2 (۱)

- N_2O و NO_2^+ , I_2^- , CO_2 (۴) CO_2 و NO_2^+ , I_2^- , ICl_2^+ (۳)

-۶۷

کدام ساختار رazonansی برای مولکول NO_2F از همه متحملتر و پایدارتر است؟



-۶۸ گشتاور دو قطبی مولکول پتاسیم برمید در فاز گازی $D = 41 \text{ cm}^3/\text{mol}$ و مولکول

پتاسیم کلرید $D = 27 \text{ cm}^3/\text{mol}$ است در صورتی که طول پیوند KCl و

طول پیوند KBr باشد، درصد خصلت یونی آن‌ها به ترتیب از راست

به چپ کدام است؟

$$(e = 4.8 \times 10^{-10} \text{ esu}, 1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu.cm}^{-1})$$


$$\begin{array}{ll} 7.80 & 7.77 \\ (2) & (1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 7.85 & 7.85 \\ (4) & (3) \end{array}$$


-۶۹ در یکی از ترکیبات زیر با سلول واحد مکعبی مراکز وجوده پر اتم‌های تنگستن در رئوس مکعب، اتم‌های اکسیژن در وسط یال‌ها و اتم سدیم در مرکز مکعب قرار دارند. این ترکیب کدام است؟




کدام یک از ساختارهای زیر مربوط به روتیل است؟ -۷۰




کامبرن ● آئرن ○
(2)



آئرن ● کامبرن ○
(1)







آئرن ● کامبرن ○
(4)



کامبرن ● آئرن ○
(3)


فرمول دقیق نیم رسانایی که از ایجاد نقص در Cu_2S حاصل شده و به صورت Cu_{1-x}S نوشته می‌شود، کدام است؟

-۷۱



اعداد styx بورهیدرید B_5H_{11} کدام است؟

-۷۲



۳۲۰۳ (۱)



۳۲۱۴ (۲)

۳۲۳۲ (۳)

۵۲۰۳ (۴)





ساختار کدام گونه شیمیایی براساس تقارن C_{2v} قابل توصیف است؟

-۷۳



اگر به گروه‌های نقطه‌ای C_n و C_{nv} (در صورتی که n فرد باشد) عنصر I اضافه شود، گروه نقطه‌ای جدید عبارتست از:

-۷۴




گروه نقطه‌ای مولکول $\text{N}_3\text{P}_2\text{Cl}_6$ که ساختار حلقوی شش عضوی دارد، کدام است؟

-۷۵



مولکول OAsCl_3 در دمای پایین به صورت دوپار درمی‌آید و پراش پرتو ایکس ساختار زیر را نشان می‌دهد. تقارن آن کدام است؟

-۷۶



<p>-۷۷ کدام یک از گونه‌های زیر دستوار (کایرال) است؟</p> <p>Ru(bipy)_۳^{۲+} (۱)</p> <p>[PtCl(dien)]^{۲+} (۴) trans-[Rh(PR_۳)_۲(H)(CO)] (۳)</p> <p>دی اتیلن تری آمین = dien</p>	<p>۴ و ۳ (۲)</p> <p>۴ و ۳، ۲، ۱ (۴)</p> <p>۱ و ۲ (۱)</p> <p>۳ و ۲، ۱ (۳)</p>
<p>-۷۸ ترازهای شکافتگی جمله‌های طیفی برای یک سیستم d^7 در میدان هشت وجهی کدام است (از چپ به راست)؟</p> <p>$^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}A_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(P)$ (۱)</p> <p>$^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}A_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(P)$ (۲)</p> <p>$^{\tau}A_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(P)$ (۳)</p> <p>$^{\tau}A_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(F)^{\tau}T_{1g}(P)$ (۴)</p>	<p>برای کدام کمپلکس اثر یان - تلر انتظار می‌رود؟</p> <p>۲۵ MnF_۳ (۲)</p> <p>۲۴ CrF_۳ (۱)</p> <p>$[_{۲۷}CoCl_4]^{3-}$ (۴)</p> <p>$[_{۲۶}FeCl_4]^{3-}$ (۳)</p>
<p>-۷۹ تعداد نوارهای مربوط به انتقال $d \rightarrow d$ در طیف الکترونی ترکیب دیامغناطیسی NiO_2^- کدام است؟</p> <p>۲ (۲)</p> <p>۳ (۳)</p>	<p>۱ (۱)</p>
<p>-۸۰ کدام نمونه پیوند چهارگانه دارد؟</p> <p>$_{\gamma}Nb_7Cl_{10}$ (۲)</p> <p>$_{\gamma}Re_7Cl_{18}^{3-}$ (۴)</p>	<p>$_{\gamma}Mn_7(CO)_{10}$ (۱)</p> <p>$_{\gamma}W_7Cl_9^{3-}$ (۳)</p>
<p>-۸۱ برای تشخیص محلول $_{۲۶}Cr^{III}$ به وسیله‌ی طیفبینی vis - uv کدام لیگاند با توجه به طیف انتقال بار آن مناسب‌تر است؟</p> <p>CN⁻ (۲)</p> <p>NH_۳ (۴)</p>	<p>F⁻ (۱)</p> <p>SCN⁻ (۳)</p>

-۸۳

کدام گزینه در مورد انرژی نوارهای کمپلکس‌های $[Co(NH_3)_5X]^{2+}$ درست است؟

۱) انرژی نوارهای میدان بلور در کمپلکس‌های $[Co(NH_3)_5X]^{2+}$ با هالیدهای مختلف X تنها به طور جزئی اختلاف دارند، اما نوارهای انتقال بار آن‌ها اختلاف انرژی بیشتری دارند.

۲) انرژی نوارهای میدان بلور در کمپلکس‌های $[Co(NH_3)_5X]^{2+}$ با هالیدهای مختلف X اختلاف انرژی زیادی دارند، اما نوارهای انتقال بار آن‌ها تنها به طور جزئی اختلاف دارند.

۳) هم انرژی نوارهای میدان بلور و هم نوارهای انتقال بار در کمپلکس‌های $[Co(NH_3)_5X]^{2+}$ با هالیدهای مختلف X تنها به طور جزئی اختلاف دارند.

۴) هم انرژی نوارهای میدان بلور و هم نوارهای انتقال بار در کمپلکس‌های $[Co(NH_3)_5X]^{2+}$ با هالیدهای مختلف X اختلاف انرژی زیادی دارند.

-۸۴

MnO_4^- اکستنده قوی‌تری نسبت به ReO_4^- است (منگنز و رنیم هر دو در یک گروه قرار دارند) عبارت کدام گزینه درست است؟

۱) نوار انتقال بار MnO_4^- در فرابینفش است در حالی که برای یون ReO_4^- در ناحیه مرئی است.

۲) نوار انتقال بار ReO_4^- در فرابینفش است در حالی که برای یون MnO_4^- در ناحیه مرئی است.

۳) هر دو نوار انتقال بار از نوع MLCT است و در ناحیه فرابینفش قرار دارند.


۴) هر دو نوار انتقال بار از نوع MLCT است و در ناحیه مرئی قرار دارند.

-۸۵

آبکافت بازی کدام یک از کمپلکس‌های زیر با کمترین سرعت انجام می‌گیرد؟



-۸۶- کمپلکس فعال نوری زیر تهیه شده و معلوم شده است که آبکافت بازی آن همراه با حفظ شیمی فضایی صورت می‌گیرد. توصیف کدام گزینه درست است؟



- (۱) آبکافت این کمپلکس با مکانیسم تفکیکی صورت می‌گیرد و حد واسط دو هرمی با قاعده مثلث دخالت دارد.

(۲) آبکافت این کمپلکس با مکانیسم تجمعی صورت می‌گیرد و حد واسط دارای عدد کوئوردیناسیون هفت دخالت دارد.

(۳) آبکافت این کمپلکس با مکانیسم تفکیکی صورت می‌گیرد و حد واسط هرم با قاعده مربع دخالت دارد.

(۴) صورت بندی صندلی لیگاند دو دندانه در تعیین شیمی فضایی نقش دارد. فرکانس کششی کربنیل در زیر قرمز در کدام کمپلکس از همه بیشتر است؟

$\text{Mo}(\text{CO})_4(\text{PMe}_3)_2$	(۲)	$\text{Mo}(\text{CO})_4(\text{PF}_3)_2$	(۱)
$\text{Mo}(\text{CO})_4(\text{PCl}_3)_2$	(۴)	$\text{Mo}(\text{CO})_4(\text{PClPh}_2)_2$	(۳)

عدد ۱۰، کدام گزینه صحیح است؟

$$\text{Mo}(\text{CO})_7(\text{PMe}_2)_2 \quad (2) \quad \text{Mo}(\text{CO})_7(\text{PF}_2)_2 \quad (1)$$

$$\text{Mo}(\text{CO})_7(\text{PCl}_2)_2 \quad (4) \quad \text{Mo}(\text{CO})_7(\text{PClPh}_2)_2 \quad (3)$$

$$[(R_P)_r Ru(\mu - Cl)_n Ru(PR_r)_r]^+ \quad , s = 4 \quad (1)$$

$$[(\eta^n - C_\delta H_\delta)(\eta^\delta - C_\delta H_\delta)Fe(CO)] \rightarrow n = 2 \quad (3)$$

$$Rh(H)_n(PPh_3)_2(CO)Cl \rightarrow n = 2 \quad (4)$$

-٨٩- احیاء هم‌لپ‌دستی . $\text{Co}(\text{CO})_5$ (۳) . $\text{Mn}(\text{CO})_8$ (۲) . $\text{Br}(1)$

$\text{R}_2\text{Si}(6)$ و $\text{Fe}(\text{CO})_5(5)$ ، $\text{CH}_2(4)$ عبارتند از:

۱) ۱ بآ ۲ و ۴ بآ ۲) ۱ بآ ۲ و ۴ بآ

٥٦٣ و ١٦٢) ٣(٥٦٤ و ٣٦٢) ٤(

مقادیر x و n در گونه زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است

$\text{NO}_2(\text{CS})\text{MgI}$

Figure 1. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

$$[(\eta^\delta - C_\delta H_\delta)(NO)_x(CS)Mn]_n$$

۱۳ و ۱) (۲) و ۱

٢٩٢ (٤) ٢٩١ (٣)

-۹۱

انحراف استاندارد نسبی یک اندازه‌گیری (برحسب درصد) وقتی که نسبت سیگنال به نویه برابر «یک» باشد کدام یک از مقادیر زیر خواهد بود؟

- (۱) صفر درصد
- (۲) ۵۰ درصد
- (۳) ۱۰۰ درصد

(۴) با حد تشخیص اندازه‌گیری برابر خواهد بود.

-۹۲

در اندازه‌گیری یون نقره به روش وزن سنجی، با استفاده از عامل رسوب‌دهنده کلرید، کدام یک صحیح نیست؟

(۱) استفاده از غلظت‌های بالاتر عامل رسوب‌دهنده سبب افزایش اندازه ذرات رسوب می‌شود.

(۲) استفاده از محلول الکترولیت NH_4NO_3 برای شستشوی رسوب، سبب کاهش مزاحمت جذب سطحی می‌شود.

(۳) با شستشوی رسوب به وسیله محلول HNO_3 رقیق می‌توان به کاهش لایه دوگانه الکتریکی کمک نمود.

(۴) رسوب‌گیری از محلول داغ آنالیت می‌تواند سبب افزایش اندازه ذرات رسوب گردد.

-۹۳

در کدام یک از موارد ذیل خطای اندازه‌گیری به خاطر ناخالصی ذکر شده، در نتیجه اندازه‌گیری اثری ندارد؟

(۱) وجود دی اکسید کربن در محلول سود در تیتراسیون اسیدها با استفاده از شناساگر متیل اورانٹ

(۲) وجود ناخالص سدیم کربنات در محلول سدیم سولفات برای تشکیل رسوب باریم سولفات و اندازه گیری به روش وزنی

(۳) وجود کاتیون یک نمک محلول در ساختمان رسوب در اندازه‌گیری‌های وزنی

(۴) وجود دی اکسید کربن در محلول سود در تیتراسیون اسیدها با استفاده از شناساگر فنل فتالین

-۹۴

مقدار یون فلزی M^{2+} را می‌توان به طریق تیتراسیون برگشتی با استفاده از مقدار اضافی Y^{4-} و محلول استاندارد Mg^{2+} در حضور شناساگر T^{2-} تعیین نمود. کدام یک از شرایط زیر برای انجام پذیر بودن تیتراسیون لازم است؟

$$K_{\text{MgT}} < K_{\text{MgY}^{2-}} < K_{\text{MY}^{2-}} \quad (1)$$

$$K_{\text{MgY}^{2-}} < K_{\text{MgT}} < K_{\text{MY}^{2-}} \quad (2)$$

$$K_{\text{MT}} < K_{\text{MgY}^{2-}} < K_{\text{MY}^{2-}} \quad (3)$$

$$K_{\text{MgY}^{2-}} < K_{\text{MY}^{2-}} < K_{\text{MgT}} \quad (4)$$

-۹۵ مخلوطی از سدیم کربنات و سدیم بی کربنات به ترتیب هر کدام به مقدار $۲۰\text{ g}/۱۰\text{ mL}$ میلی مول به همراه یکسری مواد بی اثر توسط هیدروکلریک اسید ۱ M مولار تیتر می شود. حجم مصرفی از اسید تا نقطه پایان اول و دوم از نقطه شروع به ترتیب برابر است با:

$$(۱) \quad ۳۰\text{ mL}, ۲۰\text{ mL} \quad (۲) \quad ۵۰\text{ mL}, ۲۰\text{ mL}$$

$$(۳) \quad ۵۰\text{ mL}, ۴۰\text{ mL} \quad (۴) \quad ۵۰\text{ mL}, ۳۰\text{ mL}$$

-۹۶ مخلوطی از $۱\text{ M H}_۳\text{AsO}_۴$ محلول $۲۵\text{ mL}/۰\text{ °C}$ و $۳\text{ M Na}_۳\text{HAsO}_۴$ محلول $۲۵\text{ mL}/۰\text{ °C}$ چقدر است؟

$$\text{H}_۳\text{AsO}_۴ : \text{pK}_{\text{a}_۱} = ۲/۲۴$$

$$\text{pK}_{\text{a}_۲} = ۶/۹۶$$

$$\text{pK}_{\text{a}_۳} = ۱۱/۵$$

$$(۱) \quad ۲/۲۴ \quad (۲) \quad ۲/۵۴$$

$$(۳) \quad ۶/۹۶ \quad (۴) \quad ۷/۲۶$$

-۹۷ کدام یک از معادلات زیر در مورد حلایت $\text{CuI}_{(s)}$ در حضور KI صحیح نیست؟

$$S = [\text{Cu}^+] + [\text{CuI}_\gamma^-] \quad (۱)$$

$$C_{\text{KI}} = [\text{I}^-] + ۲[\text{CuI}_\gamma^-] - [\text{Cu}^+] \quad (۲)$$

$$[\text{Cu}^+] + [\text{K}^+] = [\text{I}^-] + [\text{CuI}_\gamma^-] \quad (۳)$$

$$[\text{Cu}^+] + [\text{K}^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{CuI}_\gamma^-] + [\text{I}^-] \quad (۴)$$

-۹۸ چند میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با دانسیته $۱/۸۴\text{ g/mL}$ درجه خلوص $(\frac{W}{W})^{۹۶\%}$ باید در آب به حجم ۱۰۰ mL رقیق شود تا محلول

$$5\% \text{ سولفوریک اسید با دانسیته } \frac{g}{mL} \quad (۱/۴)$$

$$(۱) \quad ۱۸/۶۳\text{ mL} \quad (۲) \quad ۲۰/۲۲\text{ mL}$$

$$(۳) \quad ۳۶/۵۲\text{ mL} \quad (۴) \quad ۳۹/۶\text{ mL}$$

-۹۹ اگر جواب‌ها را به گونه‌ای گرد کنید که فقط ارقام با معنی باقی بمانند آنگاه برای محاسبات زیر پاسخ‌ها به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

$$4/۹۱۲ + ۰/۲۳۲۴ =$$

$$(۴۷/۳۳)(۰/۱۰۰۰) =$$

$$-\log ۱۰^{-۹} =$$

$$(۱) \quad ۵/۱۴۴۴ \quad (۲) \quad ۶/۰ \quad (۳) \quad ۵/۱۴۴ \quad (۴) \quad ۴/۷۳۳۰$$

$$(۱) \quad ۵/۱۴۴ \quad (۲) \quad ۶/۰ \quad (۳) \quad ۵/۱۴۴ \quad (۴) \quad ۴/۷۳۳$$

$$(۱) \quad ۵/۱۴۴ \quad (۲) \quad ۶/۰ \quad (۳) \quad ۵/۱۴۴ \quad (۴) \quad ۴/۷۳۳$$

(۴) $۵/۱۴۴$ و $۴/۷۳۳$ و عدد ۶ با بینهایست صفر بعد از ممیز


-۱۰۰ چنانچه به محلولی که تعادل زیر در آن برقرار است مقداری جامد KNO_3 افزوده شود، کدام یک از جملات زیر صحیح است؟



- (۱) رنگ محلول کاهش می‌یابد.
- (۲) رنگ محلول افزایش می‌یابد.
- (۳) ثابت تعادل غلظتی افزایش می‌یابد.
- (۴) رنگ محلول بدون تغییر باقی می‌ماند.


-۱۰۱ در تیتراسیون 100mL محلول معجهول As^{3+} در حضور I^- اضافی با جریان ثابت تا تغییر رنگ شناساگر چسب نشاسته 200 ثانیه زمان لازم است. اگر به این محلول 20mL محلول استاندارد As^{3+} به غلظت $25\text{M}\text{ }^{\circ}/\text{o}$ بیفزاییم زمان لازم تا تغییر رنگ شناساگر 100 ثانیه افزایش می‌یابد. جریان استفاده شده و غلظت معجهول چقدر است؟

$$F = 96500 \frac{C}{\text{mol}}$$



- (۱) $965\text{ }^{\circ}/\text{o}$ آمپر و $25\text{ }^{\circ}/\text{o}$ مولار
- (۲) $965\text{ }^{\circ}/\text{o}$ آمپر و $125\text{ }^{\circ}/\text{o}$ مولار
- (۳) $1930\text{ }^{\circ}/\text{o}$ آمپر و $25\text{ }^{\circ}/\text{o}$ مولار
- (۴) $1930\text{ }^{\circ}/\text{o}$ آمپر و $125\text{ }^{\circ}/\text{o}$ مولار

-۱۰۲ کدام یک از نمودارهای زیر مربوط به نحوه اعمال پتانسیل در تکنیک ولتاوتمتری پالسی تفاضلی است؟



- ۱۰۳- کدام یک از عوامل زیر بر خصوصیات فیزیکی رسوب حاصله در سطح الکترود به روش الکتروگراویمتری مؤثر نیست؟

- (۱) چگالی جریان
 (۲) جنس الکترود
 (۴) حضور عوامل کمپلکس دهنده
 (۳) هم زدن محلول

- ۱۰۴- ولتاژ مولار 5 mol/L مولول 10^{-3} M نسبت به Cd^{2+} موجی برای آن یون با جریان نفوذی برابر با 1 mA می‌دهد. اگر جریان در ناحیه جریان حد به مدت ۱۶ دقیقه ادامه یابد، درصد تغییر در غلظت محلول چقدر

$$\text{F} = 96000 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$$

۰/۱ (۲)	۰/۰۵ (۱)
۰/۵ (۴)	۰/۲ (۳)

- ۱۰۵- به 5 mol/L مولول 1 mol/L مولار یک اسید ضعیف، 25 mL محلول سود 1 mol/L مولار می‌افزاییم. پتانسیل الکترود پلاتین در حضور گاز هیدروژن با فشار 1 atm در این محلول 2368 mV ولت می‌شود. pK_a اسید چقدر است؟

- | | |
|-------|----------|
| ۲ (۲) | ۰/۲۵ (۱) |
| ۸ (۴) | ۰/۲ (۳) |

- ۱۰۶- پتانسیل نیمه موج ($E_{\frac{1}{2}}$) محلول Pb^{2+} برابر 125 mV - ولت است. اگر

محلولی حاوی 1 mol/L مولار از یون Pb^{2+} و 1 mol/L مولار یون Br^- باشد، پتانسیل نیمه موج به 954 mV - ولت می‌رسد. ثابت تشکیل کمپلکس PbBr^+ چقدر است؟

- | | |
|----------|-----------|
| ۰/۰۱ (۲) | ۰/۰۰۱ (۱) |
| ۱۰۰۰ (۴) | ۱۰۰ (۳) |

- ۱۰۷- اضافه ولتاژ نتیجه کدام یک از گزینه‌های ذیل است؟

الف) اختلاف غلظت یون‌ها روی سطح الکترود و توده محلول





ب) کاهش در پتانسیل به علت مقاومت بیشتر محلول

ج) کاهش سرعت حرکت یون‌ها در داخل محلول

د) کاهش سرعت واکنش الکتروشیمیایی در سطح الکترود

- | | |
|-------------|-------------|
| (۱) الف | (۲) ب |
| (۳) الف و ج | (۴) الف و د |

- ۱۰۸- در کدام یک از تیتراسیون‌های پتانسیومتری ذیل، پتانسیل نقطه هم ارزی تابع هر دو عامل pH و پتانسیل استاندارد زوج اکسیده است؟



- ۱۰۹- افزایش KNO₃ به محلولی حاوی I⁻ با غلظت ۰/۰۲ مولار و I⁻ با غلظت ۰/۰۵ مولار، چه تأثیری در پتانسیل محلول دارد؟

(۱) کاهش می‌یابد.

(۲) افزایش می‌یابد.

(۳) تأثیری ندارد.

(۴) بستگی به غلظت KNO₃ دارد.

- ۱۱۰- در روش کروماتوگرافی گازی، جداسازی با استفاده از کدام گاز حامل سریعتر انجام می‌شود؟

H₂ (۱)

He (۲)

N₂ (۳)

(۴) سرعت جداسازی در GC مستقل از نوع گاز حامل است.

- ۱۱۱- در صورتی که سرعت حرکت یک ترکیب در ستون کروماتوگرافی ۱۰٪ سرعت فاز متحرک باشد، مقدار فاکتور ظرفیت عبارتست از:

۹/۱ (۲) ۰/۱ (۱)

۹/۰ (۴) ۱۰ (۳)

- ۱۱۲- چنانچه محلول ۱۲ ppm سرب پاسخ معادل ۵۰٪ جذب را در جذب اتمی از خود نشان دهد، حساسیت جذب اتمی برای این عنصر کدام است؟

(۱) ۰/۰۷۵ ۰/۱۷۶ (۲)

۰/۳۴۲ ۰/۶۸۴ (۳)

- ۱۱۳- وجود منبع تابش دو تریم در دستگاه جذب اتمی به چه منظوری است؟

(۱) اندازه‌گیری گونه‌های ملکولی موجود در شعله

(۲) به عنوان منبع تابش پیوسته برای تعدادی از عناصر

(۳) تصحیح جذب زمینه

(۴) تنظیم کننده طول موج

- ۱۱۴- در تکنیک ICP-AES با دمای (K¹⁰⁰⁰⁰) در مقایسه با شعله (C₂H₂ - N₂O) با دمای K³⁰⁰⁰ شدت خطوط نشری و میزان یونیزاسیون به ترتیب است.

(۱) کمتر و کمتر

(۳) بیشتر و بیشتر

- ۱۱۵

کدام عبارت صحیح نیست؟

- (۱) در غیاب میدان مغناطیسی همه هسته‌های H سطوح انرژی برابر دارند.
- (۲) پروتون‌های یکسان در میدان مغناطیسی برابر فرکانس‌های یکسانی را جذب می‌کنند.
- (۳) هسته‌های H با محیط‌های شیمیایی متفاوت در غیاب میدان مغناطیسی، سطوح انرژی متفاوتی دارند.
- (۴) محیط شیمیایی پروتون‌ها بر میزان اختلاف انرژی آنها در میدان مغناطیسی اثر دارد.

- ۱۱۶ همه عبارات زیر درباره طیف‌سنجی رامان صحیح هستند به جز:

- (۱) با افزایش شدت منبع، شدت خطوط استوکس و آنتی استوکس بدون تغییر باقی می‌ماند.
- (۲) حساسیت رامان نرمال برای کار کمی کمتر از IR است.
- (۳) میزان جابه‌جایی رامان در یک ترکیب مستقل از طول موج تابش است.
- (۴) در این نوع طیف‌سنجی می‌توان از آشکارسازهای نواحی UV-Vis استفاده کرد.

- ۱۱۷ مقدار درصد تغییر در فلورسانس محلولی را حساب کنید که در آن اندازه‌گیری به گونه‌ای انجام می‌شود که با تغییر طول موج بازده فلورسانس ϕ به 70° درصد مقدار اولیه بررسد، ضریب خاموشی (E) به اندازه $1/5$ برابر افزایش یابد و شدت منبع تابش (I_0) دو برابر گردد.

- (۱) ۱۱۰٪
- (۲) ۱۵۰٪
- (۳) ۲۰۰٪
- (۴) ۲۱۰٪

- ۱۱۸ در طیف‌سنجی فلئورسانس:

- (۱) طیف نشر فلئورسانس همواره تصویر آینه‌ای طیف تهییج می‌باشد.
- (۲) طول موج ماکریزم نشر فلئورسانس غالباً مستقل از طول موج برانگیختگی است.
- (۳) شدت نشر فلئورسانس مستقل از طول موج برانگیختگی است.
- (۴) همه موارد صحیح‌اند.

- ۱۱۹ اگر ترکیب A با فرمول $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ در طول موج 184nm دارای جذب باشد، انتظار دارید که ماکریزم جذب ترکیب B با فرمول $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ به طرف چه طول موج‌هایی جابه‌جا شود و شدت آن چگونه نسبت به پیک A تغییر یابد؟

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (۱) آبی، شدت بیشتر | (۲) آبی، شدت کمتر |
| (۳) قرمز، شدت بیشتر | (۴) قرمز، شدت کمتر |

- ۱۲۰- جذب محلول B، که حاوی $\text{NaOH} 1\text{M}$ و $\text{NaX} 0.1\text{M}$ است

و در آن فقط X^- جذب دارد. در حالی که محلول D که حاوی 0.2M HX است، در همان سل و همان طول موج دارای جذب 0.138M می‌باشد. ثابت تفکیک اسید HX کدام است؟

(۱) $167/0.00$

(۲) $167/10^{-5}$

(۳) $167/0.01$

شیمی فیزیک

- ۱۲۱- فشار اسمزی محلول 1M نمک خوراکی در آب در دمای 25°C و یک اتمسفر 186torr است. در چه شرایطی می‌توان از محلولی حاوی صد گرم آب که در آن 58.5g نمک خوراکی حل شده است، آب شیرین تهیه کرد؟

$$\text{جرم مولی نمک خوراکی} = \frac{\text{g}}{\text{mol}} (58.5)$$

(۱) با اعمال فشاری معادل 93 torr

(۲) با اعمال فشاری معادل $167/6\text{ torr}$

(۳) با اعمال فشاری بیش از 186 torr

(۴) با اعمال فشاری کمتر از 186 torr

- ۱۲۲- برای محاسبه عدد انتقال یونها در یک محلول الکترولیتی از کدام روش استفاده می‌شود؟

(۱) مرز متحرک

(۲) روش هیتروف

(۳) پیلهای غیر برگشت‌پذیر

(۴) هر سه

- ۱۲۳- حرک کدام یون در یک محلول آبی از همه بیشتر است؟



- ۱۲۴- برای محلولی شامل 6 g اوره در 9M مول آب، کاهش فشار بخار در 100°C کدام است؟

$$M_{\text{urea}} = 60\text{ g.mol}^{-1}, M_{\text{H}_2\text{O}} = 18\text{ g.mol}^{-1}$$

(۱) 69 mmHg

(۲) 76 mmHg

(۳) 79 mmHg

(۴) 86 mmHg

- ۱۲۵- در نقطه انجماد کدام یک از خواص زیر برای دو فاز جامد و مایع برابرند؟

(۱) آنتروپی

(۲) انرژی درونی

(۳) پتانسیل شیمیابی

(۴) چگالی

- ۱۲۶- شب نمودار ΔG_{mix} (تغییر انرژی آزاد گیپس ناشی از فرآیند اختلاط) بر

حسب دما چگونه است (در فشار ثابت و نسبت ترکیب اجزاء بدون تغییر)؟


(۱) کوچک‌تر از صفر

(۲) بزرگ‌تر از صفر

(۳) مساوی صفر

(۴) بزرگ‌تر یا مساوی صفر

- ۱۲۷ ضریب فعالیت میانگین محلول 1° مولال کدامیک از محلول‌های الکترولیتی زیر در دمای 25°C بزرگتر است؟



- ۱۲۸ دو مایع امتزاج ناپذیر در فشار ثابت به ترتیب در دمای T_A^* و T_B^* می‌جوشند که $T_B^* > T_A^*$ است. مخلوط این دو مایع در چه دمایی به جوش می‌آید؟

$T_B^* \quad (2)$

$\frac{T_A^* T_B^*}{2} \quad (4)$

$T_A^* \quad (1)$

$\frac{T_A^* + T_B^*}{2} \quad (3)$


- ۱۲۹ برای واکنش زیر کدام رابطه بین ثابت‌های سرعت برقرار است؟

$k_1 k_2 k_{-3} = k_{-1} k_{-2} k_3 \quad (1)$

$k_1 k_2 k_3 = k_{-1} k_{-2} k_{-3} \quad (2)$

$k_1 k_{-2} k_3 = k_{-1} k_2 k_{-3} \quad (3)$

$k_1 k_{-1} = k_2 k_{-2} = k_3 k_{-3} \quad (4)$



- ۱۳۰ اگر ثابت سرعت یک واکنش بصورت $k = \frac{k_1^{1/2} k_2}{k_{-1}}$ به ثابت‌های سرعت واکنش‌های بنیادی مرتبط باشد، انرژی فعالسازی واکنش بر حسب انرژی فعالسازی واکنش‌های بنیادی است.

$2E_{a_1} + {}^{1/2} \Delta E_{a_2} - E_{a_{-1}} \quad (2) \quad 2E_{a_1} + E_{a_{-1}} + {}^{1/2} \Delta E_{a_2} \quad (1)$

$\frac{E_{a_1} + 2E_{a_2}}{E_{a_1}} \quad (4) \quad {}^{1/2} \Delta E_{a_1} + 2E_{a_2} - E_{a_{-1}} \quad (3)$

- ۱۳۱ مرتبه و مولکولاریته یک واکنش چه رابطه‌ای با هم دارند؟

(۱) یکسان هستند (۲) همیشه متغیرند

(۳) به غلظت بستگی دارند (۴) به مکانیسم بستگی دارد

- ۱۳۲ در دما و فشار معین، یک ماده مرکب با سرعت ثابتی تجزیه می‌شود مرتبه‌ی واکنش نسبت به آن ماده برابر است با:

(۱) صفر (۲) یک

(۳) سه (۴) دو

- ۱۳۳ - کدام گزینه در مورد $\frac{\partial C_p}{\partial P}_T$ صحیح است؟ (۱) ضریب ژول همدما است

$$C_p \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_P \quad (2) \quad \mu \left(\frac{\partial C_p}{\partial T} \right)_P \quad (1)$$

$$-\mu \left(\frac{\partial C_p}{\partial T} \right)_P - C_p \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_P \quad (4) \quad \mu \left(\frac{\partial C_p}{\partial T} \right)_P + C_p \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_P \quad (3)$$

- ۱۳۴ - شب نمودار $\frac{\Delta G}{T}$ بر حسب دما برای واکنش گرماده در فشار ثابت چگونه است؟

(۱) کوچکتر از صفر (۲) مساوی صفر


(۳) بزرگتر از صفر (۴) کوچکتر یا مساوی صفر

- ۱۳۵ - برای واکنش $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ با فرض کامل بودن گازها کدام گزینه صحیح است؟

$$\Delta H < \Delta E \quad (2) \quad \Delta H > \Delta E \quad (1)$$

$$\Delta H = \Delta E = 0 \quad (4) \quad \Delta H = \Delta E \quad (3)$$


- ۱۳۶ - در دمای ثابت برای واکنش تعادلی زیر تعداد اجزاء تشکیل دهنده (C)، تعداد فاز موجود (P) و درجه آزادی (F) به ترتیب برابرند با:



$$F = 2, P = 3, C = 4 \quad (2) \quad F = 1, P = 3, C = 3 \quad (1)$$

$$F = 0, P = 4, C = 3 \quad (4) \quad F = 1, P = 4, C = 5 \quad (3)$$

- ۱۳۷ - بر اساس نمودار زیر (فشار بر حسب حجم) مشخص کنید که ارتباط بین مقادیر مطلق کار انجام شده در هر یک از مراحل چگونه است؟



$$w_2 > w_1 > w_3 \quad (1)$$

$$w_1 > w_3 > w_2 \quad (2)$$

$$w_3 > w_1 > w_2 \quad (3)$$

$$w_3 > w_2 > w_1 \quad (4)$$

- ۱۳۸ - در واکنش‌های خود به خود:

(۱) ΔH سیستم منفی است.

(۲) ΔH سیستم مثبت است.

(۳) سیستم ΔH برابر صفر است.

(۴) سیستم ممکن است منفی یا مثبت باشد.

- ۱۳۹ - برای اینکه گازی رفتار ایده‌آل داشته باشد، کدام شرط باید برقرار باشد؟

(d) قطر مولکول گاز، λ ، پویش آزاد میانگین).

$$\lambda \geq d \quad (2) \quad \lambda \gg d \quad (1)$$

$$d \gg \lambda \quad (4) \quad d \geq \lambda \quad (3)$$

-۱۴۰

قانون دوم ترمودینامیک چه چیزی را بیان می کند؟

(۱) بقاء انرژی

(۲) پیشرفت به سمت تعادل

(۳) تعادل گرمایی

-۱۴۱

اگر e^{-ax} تابع ویژه عملگر P_x باشد، مقدار P_x چه مقدار باید باشد؟(۱) $1+a$ (۲)(۳) $-a$ (۴)(۱) $1-a$

(۳)

-۱۴۲

اگر برای حل مسئله اتم هیدروژن، مبدأ مختصات را به جای موقعیت هسته، در مکان دیگری در نظر بگیریم، ترازهای انرژی چه تغییری می کنند؟

(۱) افزایش می یابند.

(۲) بدون تغییر باقی می مانند.

(۳) کاهش می یابند.

(۴) بعضی افزایش و بعضی کاهش می یابند.

-۱۴۳

تأثیر عملکرد پایین بر \hat{L} بر روی $Y_{l=1}^{m=1}(\theta, \phi)$ چیست؟ Y_0^1 (۲) Y_0^0 (۱) Y_1^1 (۴) Y_1^0 (۳)

-۱۴۴ کدام عملگر هرمیتی است؟

 e^{ix} (۲) $-ix \frac{\partial}{\partial y}$ (۱) ix (۴) $x^r \left(\frac{d}{dx} \right)$ (۳)

-۱۴۵

کدام یک از اریتال های P جواب معادله شرودینگر است؟ P_x (۲) P_z (۱)

(۴) هیچ کدام

 P_y (۳)

-۱۴۶

 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ برای ذره در جعبه یک بعدی کدام است؟ $\pm \frac{nh}{2L}$ (۲) $\frac{n^2 h^2}{4L}$ (۱) $\pm \frac{nh}{\sqrt{L}}$ (۴) $\frac{n^2 h^2}{9L}$ (۳)

-۱۴۷

ممان مغناطیسی یک هسته ممان مغناطیسی یک الکترون است.

(۱) بسیار کمتر از

(۲) مساوی با

(۳) بسیار بیشتر از

(۴) تقریباً مساوی از

- ۱۴۸

آیا تابع موج برای ذره در جعبه یک بعدی را می توان برای اتم هیدروژن بکار برد؟

۱) بله، زیرا هر دو تابع موج خوش رفتار هستند.

۲) بله، زیرا ترازهای انرژی ذره در جعبه یک بعدی مانند اتم هیدروژن است.

۳) خیر، زیرا انرژی پتانسیل این دو سیستم متفاوت است.

۴) خیر، زیرا ترازهای انرژی برای ذره در جمله یک بعدی واگرای است.

اگر λ_0 طول موج آستانه نشر فتو الکترونیک، λ طول موج نور تابشی به سطحفلز و m جرم یک الکترون باشد، سرعت الکترون کنده شده برابر است با:

$$\left[\frac{2hc}{m} (\lambda_0 - \lambda) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$\left[\frac{2hc}{m} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\left[\frac{2h}{m} (\lambda_0 - \lambda) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

- ۱۵۰

برای مولکول HCl در معرض امواج کهموج اگر گذار بین دو تراز چرخشی متواالی

رخ داده باشد، مقدار ممان اینرسی ملکول بر حسب h چقدر استاگر $B = 4 \text{ joule}$ باشد؟

$$\frac{h^2}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{8h^2}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{64h^2}{\pi} \quad (3)$$



515A

515

A

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

دفترچه شماره ۲
صبح جمعه
۹۲/۱۱/۱۸



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مجموعه شیمی – کد ۱۲۰۳

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی ۱ و ۲، اصول تصفیه آب و بسابهای صنعتی و خوردگی فلزات)	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.
این آزمون نمره منفی دارد.


حق چاپ و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین پرایر مقررات رفتار می شود.

-۱۵۱ اگر آب از یک چاه عمیق توسط یک پمپ کشیده شده و به یک منبع هوایی ارسال گردد و این عمل ایزوترمال صورت پذیرد، معادله کلی انرژی برای این عمل کدام است؟ از هدر رفتن انرژی صرف نظر می‌شود.

$$\begin{array}{ll} -W = \Delta[(\hat{H} + \hat{K})m] & (1) \\ -W = \Delta[(\hat{K})m] & (2) \\ -W = \Delta[(\hat{P} + \hat{K})m] & (3) \\ -W = \Delta[(\hat{P} + \hat{H})m] & (4) \end{array}$$


-۱۵۲ در شکل زیر یک سیستم تولید آمونیاک با روش برگشتی (Recycle) داده شده

$$\text{است. مقدار جریان } R \text{ بر حسب } \frac{\text{mol}}{\text{s}} \text{ چقدر است؟}$$



$$\begin{array}{ll} 60 & (1) \\ 100 & (2) \\ 100 & (3) \end{array}$$

-۱۵۳ مقدار جریان G بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{min}}$ در شکل زیر چقدر است؟



$$\begin{array}{ll} 1/5 & (1) \\ 6 & (2) \\ 5 & (3) \\ 10 & (4) \end{array}$$

-۱۵۴ چند کیلوگرم اسید سولفوریک خالص باید به ۱۰۰ کیلوگرم محلول اسید سولفوریک ۱٪ وزنی در آب اضافه گردد تا یک محلول اسید سولفوریک ۳٪ وزنی بددست آید؟

$$\begin{array}{ll} 2/06 & (1) \\ 12/06 & (2) \\ 12/06 & (3) \end{array}$$

- ۱۵۵ دانسیته گاز CO_2 در شرایط 44°C و $44/\text{atm}$ بر حسب $\frac{\text{gr}}{\text{lit}}$ کدام است؟

- (۱) ۲۲/۴
 (۲) ۳۲/۴
 (۳) ۶۶
 (۴) ۸۸

- ۱۵۶ معادله Clausius-Clapeyron برای محاسبه چه عاملی بکار گرفته می‌شود؟

- (۱) فشار بخار خالص
 (۲) ضریب هدایت حرارتی
 (۳) حرارت تبخیر
 (۴) ضریب کنداکتیویتی

- ۱۵۷ اختلاف بالای دماهای خشک و مرطوب برای یک هوا یا گاز مرطوب نشان‌دهنده رطوبت نسبی و قدرت خشک‌کنندگی هوا یا گاز است.

- (۱) پایین - بالای
 (۲) پایین - پایین
 (۳) بالا - بالای
 (۴) بالا - پایین

- ۱۵۸ کدام حالت، انتقال جرم محسوب نمی‌شود؟

- (۱) گرفتن آب اضافی جامدات مرطوب به وسیله پرس کردن
 (۲) کاهش رطوبت مواد جامد با بالا بردن دمای سطح آنها
 (۳) خشک کردن ذرات جامد مرطوب با دمش هوای گرم و خشک
 (۴) گرفتن رطوبت مواد جامد به روش تماس آنها با هوای با رطوبت کم

- ۱۵۹ هرگاه یک جریان در لوله‌ای صاف جاری باشد، ضریب اصطکاک به چه عواملی بستگی دارد؟

- (۱) سرعت، قطر لوله، چگالی، لزجت و فشار سیال
 (۲) سرعت، قطر لوله، چگالی، لزجت و طول لوله
 (۳) سرعت، قطر لوله، چگالی و لزجت سیال
 (۴) دبی، طول لوله، چگالی و لزجت سیال

- ۱۶۰ در چه حالتی می‌توان به طور تقریبی رابطه ضریب کلی انتقال حرارت (U) را با ضریب فردی جابجایی انتقال حرارت (h_i, h_o) به صورت زیر نوشت؟


$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}$$

- (۱) دو لوله که یکی درون دیگری است نقش مبدل را بازی می‌کنند.
 (۲) زمانی که سطح مشترک بین دو محیط گرم و سرد مسطح باشد.
 (۳) زمانی که سطح مشترک بین دو محیط گرم و سرد بسیار بزرگ باشد.
 (۴) زمانی که لایه نازک فلزی بین محیط گرم و محیط سرد بسیار نازک باشد.

- ۱۶۱ کدام یک از آکنه‌های زیر (Packings) ضریب HETP کوچکتری دارند؟

- (۱) حلقه پال "۱"
 (۲) زین اسپی "۱"
 (۳) حلقه راشیگ "۱"
 (۴) حلقه لسینگ "۱"

-۱۶۲ در شکل زیر دو منبع با فشار متفاوت با یک لوله ॥ شکل به یکدیگر وصل شده است. کدام عبارت در مورد این شکل درست است؟



(۱) اختلاف فشار بین این دو منبع حدود ۱۰٪ اتمسفر است.

(۲) اختلاف فشار بین این دو منبع حدود ۱۵۰ پاسکال است.

(۳) اختلاف فشار بین دو منبع حدود ۳ psi است.

(۴) حجم ظرف A بسیار بزرگتر از حجم ظرف B بوده است.

-۱۶۳ اگر یک هوای اشباع را تحت فشار ثابت خنک کنیم، کدام یک از عبارات زیر صحیح هستند؟

(۱) رطوبت نسبی ثابت باقی بماند.

(۲) رطوبت ثابت باقی بماند.

(۳) درجه حرارت نقطه شبنم ثابت باقی بماند.

(۴) درجه حرارت مرطوب ثابت باقی بماند.

-۱۶۴ در چه شرایطی عمل تبخیر جزئی دو جزئی A و B ارزش اقتصادی دارد؟

(۱) وقتی که ضریب فراریت $\alpha = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B}$ نزدیک به یک شود.

(۲) وقتی که ضریب فراریت مساوی با یک شود.

(۳) وقتی که ضریب فراریت بزرگتر از ۳ باشد.

-۱۶۵ در یک برج تقطیر، هر یک مل از خوراک ورودی، ۱٪ از مل بخارات داخل برج را مایع می‌کند. شبیه معادله خط خوراک چقدر است؟

(۱) ۱/۵ (۲) ۲/۱

(۳) ۲/۵ (۴) ۱۱

-۱۶۶ در چه حالتی یک برج تقطیر دو جزئی با یک خوراک ورودی و دو محصول بالا و پایین برج (W, D) فقط یک خط تبادل (Operating line) دارد؟

(۱) وقتی که نزدیک به شرایط حداقل نسبت برگشت کار می‌کند.

(۲) وقتی که ضریب فراریت α_{A-B} بزرگ باشد.

(۳) وقتی که دبی فازهای مایع و بخار داخل برج نسبت به محصولات D و W بسیار بزرگ باشند.

(۴) وقتی که درجه حرارت سینی‌ها تقریباً یکسان باشند.

- ۱۶۷ معادله خط تبادل (Operating line) بالای برج تقطیر به صورت $y = ۰/۳۶x + ۰/۶$ می‌باشد. درصد عنصر سبک‌تر در محصول بالای برج چقدر است؟

- (۱) ۸۵٪ (۲) ۹۰٪ (۳) ۹۶٪ (۴) ۹۸٪

- ۱۶۸ تقطیر کدام یک از مخلوط‌های دوتائی زیر (در شرایط یکسان) مشکل‌تر است؟

- (۱) آب و استن (۲) آب و اسید استیک (۳) آب و متانول (۴) بنزن و تولوئن

شیمی کاربردی (اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی)

- ۱۶۹ از آبی با سختی کل و قلیانیت کل به ترتیب ۴۰۰ ppm و ۳۰۰ ppm معادل کربناتی، چای تهیه شده است. پیش‌بینی می‌کنید که سختی کل و قلیانیت کل چای دم شده به ترتیب حدود چقدر باشد؟

- (۱) ۰°C (۲) ۱۰۰°C (۳) ۳۵°C (۴) ۴۰۰°C

- ۱۷۰ MPN واحد کدام یک از شاخص‌های آب و فاضلاب است؟

- (۱) سختی آب (۲) املال محلول آب (۳) آلودگی به مواد سمی (۴) آلودگی به فاضلاب انسانی

- ۱۷۱ اگر آبی از روی فیلتر رزین‌های کاتیونی هیدروژنی تازه احیا شده، عبور داده شود کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

- (۱) pH آب زیاد می‌شود. (۲) قلیاییت آب زیاد می‌شود. (۳) آب کم می‌شود. (۴) TDS آب زیاد می‌شود.

- ۱۷۲ فیلتر چکنده (Trickling Filter) برای کاهش کدامیک از شاخص‌های زیر بکار می‌رود؟

- (۱) سختی آب (۲) TSS, BOD (۳) TDS, TSS (۴) PH, TDS

- ۱۷۳ حجم پساب اضافی در فرآیند کاهش سختی آب، در کدام روش بیشتر است؟

- (۱) اسمز معکوس (۲) آهک زنی (۳) تقطیر (۴) رزین تعویض یونی

- ۱۷۴ برای کاهش زمان ماند لازم در لاغون‌های تصفیه فاضلاب چه می‌توان کرد؟

- (۱) لاغون‌ها را عمیق‌تر انتخاب کرد. (۲) لاغون‌ها را عریض‌تر انتخاب کرد. (۳) لاغون‌ها را طویل‌تر انتخاب کرد. (۴) لاغون‌ها را هواده‌ی کرد.

۱۷۵ - سرعت خوردگی یک قطعه فولاد زنگ نزن آستینتی در محیط محلول آبی سولفوریک اسید در حالت حرکت با ازدیاد سرعت سیال
 ۱) کاهش می‌یابد ۲) افزایش می‌یابد
 ۳) تغییر نمی‌کند ۴) افزایش و سپس کاهش می‌یابد

۱۷۶ - علت وقوع خوردگی حفره‌ای کدام است؟
 ۱) شکست لایه محافظ فلز ۲) تنش موجود در فلز
 ۳) اتصال به یک فلز ثانوی ۴) هیچ کدام

۱۷۷ - رعایت حداقل غلظت مجاز برای کنترل خوردگی، در مورد کدام بازدارنده مهم‌تر می‌باشد؟
 ۱) بنزووات ۲) سیلیکات
 ۳) فسفات ۴) کرومات

۱۷۸ - هر اندازه مقدار جریان مبادله \dot{N} برای یک فلز در حال تعادل، مقدار بیشتری داشته باشد:
 ۱) جریان آندی ضعیفتر است. ۲) جریان خوردگی فلز شدیدتر است.
 ۳) جریان کاتدی شدیدتر است. ۴) شبکاتی تاقلی شدیدتر است.

۱۷۹ - کدام نوع پلاریزاسیون یا قطبش نیمه واکنش‌های منجر به خوردگی فلز، تحت تأثیر سرعت سیال قرار می‌گیرد؟
 ۱) فعالیتی ۲) غلظتی
 ۳) هر دو ۴) هیچ کدام

۱۸۰ - کدام یک از ظروف زیر برای نگهداری فلوئوریک اسید (HF) مناسب‌تر است?
 ۱) آلومینین (AL) ۲) فولادهای سیلیسی (Si)
 ۳) سرامیک ۴) منیزیم (Mg)

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ می رسانند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش فارغ گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۲/۸ با مراجعة به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات اماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

نوع دفترچه	نام رشته امتحانی	کد رشته امتحانی
A	مجموعه شیمی	1203

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	2	31	2	61	2	91	3	121	3	151	4
2	1	32	3	62	3	92	1	122	4	152	2
3	4	33	4	63	4	93	4	123	2	153	1
4	3	34	4	64	1	94	1	124	2	154	2
5	1	35	4	65	1	95	2	125	3	155	4
6	2	36	1	66	4	96	3	126	1	156	3
7	4	37	2	67	2	97	2	127	1	157	1
8	3	38	2	68	2	98	4	128	1	158	1
9	1	39	1	69	3	99	4	129	2	159	3
10	4	40	3	70	3	100	1	130	3	160	4
11	2	41	4	71	4	101	1	131	4	161	1
12	3	42	4	72	1	102	4	132	1	162	2
13	3	43	1	73	4	103	2	133	4	163	1
14	1	44	1	74	4	104	2	134	3	164	3
15	2	45	4	75	3	105	3	135	3	165	4
16	1	46	4	76	3	106	4	136	4	166	3
17	3	47	2	77	1	107	4	137	2	167	2
18	4	48	3	78	2	108	3	138	4	168	2
19	1	49	1	79	2	109	2	139	1	169	2
20	4	50	3	80	2	110	1	140	4	170	4
21	2	51	3	81	4	111	2	141	2	171	3
22	3	52	2	82	1	112	2	142	2	172	2
23	2	53	2	83	1	113	3	143	3	173	1
24	4	54	2	84	2	114	3	144	1	174	4
25	1	55	1	85	1	115	3	145	1	175	3
26	3	56	1	86	3	116	1	146	2	176	1
27	2	57	1	87	1	117	1	147	1	177	4
28	3	58	3	88	4	118	2	148	3	178	2
29	2	59	4	89	2	119	4	149	4	179	2
30	1	60	1	90	3	120	3	150	4	180	4

شماره سوال	گزینه صحیح								
181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید

195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید	321	سفید
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید	322	سفید
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید	323	سفید
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید	324	سفید
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید	325	سفید
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید	326	سفید
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید	327	سفید
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید	328	سفید
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید	329	سفید
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید	330	سفید

خروج