

618

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

عصر جمعه
۹۱/۱۱/۲۰



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی - علوم باگبانی - کد ۱۳۰۵

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	میوه کاری	۳۰	۳۱	۶۰
۳	خاک شناسی و گیاه شناسی	۳۰	۶۱	۹۰
۴	ازدیاد نباتات	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	سبزیکاری و گلکاری	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

پیمن ماه سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Currently 80 percent of drugs are shot down in early clinical trials because they are not effective or are even -----.
 1) intense 2) initial 3) toxic 4) prior
- 2- With such rapid advances in the field of human transplantation, researchers such as myself are now beginning to consider what some have previously ----- unthinkable: transplanting a human brain.
 1) deemed 2) pursued 3) perplexed 4) excluded
- 3- Weather forecasters are a frequently humbled bunch. No matter how far their science advances, the atmosphere finds ways to ----- prediction.
 1) underlie 2) defy 3) expose 4) strive
- 4- Many armed groups ----- mix with the population to avoid identification. Sometimes they actually use civilians as shields.
 1) inherently 2) coincidentally 3) persuasively 4) deliberately
- 5- After receiving a phone call that a bomb had been planted somewhere in the hotel, Police ordered the ----- of the building.
 1) resistance 2) evacuation 3) authority 4) invalidity
- 6- Cosmologists, however, can make ----- about the early universe based on the cosmic microwave background radiation, which was emitted about 400,000 years after the big bang.
 1) concessions 2) ramifications 3) foundations 4) deductions
- 7- The fact that there are many earth-like planets in the universe supports the widely held view that life ----- the universe.
 1) pervades 2) innovates 3) exemplifies 4) overlaps
- 8- Centuries before the development of effective cannons, huge artillery pieces were demolishing castle walls with ----- the weight of an upright piano.
 1) estimations 2) ensembles 3) barricades 4) projectiles
- 9- People in their late 90s or older are often healthier and more ----- than those 20 years younger.
 1) civil 2) durable 3) robust 4) concurrent
- 10- One of the first prominent geologists to raise concern that global warming might ----- a catastrophic collapse of the Antarctic ice cap was J. H. Mercer.
 1) trigger 2) negate 3) exceed 4) replace

Part B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Our hunt for caloric restriction mimetics grew out of our desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ----- a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats (12) ----- a reduced incidence of conditions (13) ----- . What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ----- that the maximum life span (the oldest attainable age), not merely the average life span, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase (15) ----- , but only approaches that slow the body's rate of aging will increase the maximum life span.

- | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|---|
| 11- 1) feed | 2) they were fed | 3) fed | 4) feeding |
| 12- 1) to have | 2) had | 3) in having | 4) and had |
| 13- 1) in old age they became increasingly common
2) that become increasingly common in old age
3) becoming common in increasingly old age
4) they became in old age increasingly common | | | |
| 14- 1) which means | | 2) but means | 3) it means 4) what it means |
| 15- 1) the average time in survival population | | 2) a survival population average time | 4) the survival time in average population |
| 3) a population's average survival time | | | |

Part C. Reading Comprehension

Directions: *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

PASSAGE 1

Losses of horticultural produce are a major problem in the post-harvest chain. They can be caused by a wide variety of factors, ranging from growing conditions to handling at retail level. Not only are losses clearly a waste of food, but they also represent a similar waste of human effort, farm inputs, livelihoods, investments and scarce resources such as water. Post-harvest losses for horticultural produce are, however, difficult to measure. In some cases everything harvested by a farmer may end up being sold to consumers. In others, losses or waste may be considerable. Occasionally, losses may be 100%, for example when there is a price collapse and it would cost the farmer more to harvest and market the produce than to plough it back into the ground. Use of average loss figures is thus often misleading. There can be losses in quality, as measured both by the price obtained and the nutritional value, as well as in quantity. There are numerous factors affecting post-harvest losses, from the soil in which the crop is grown to the handling of produce when it reaches the shop. Pre-harvest production practices may seriously affect post-harvest returns. Plants need a continuous supply of water for photosynthesis and transpiration. Damage can be caused by too much rain or irrigation, which can lead to decay; by too little water; and by irregular water supply, which can, for example, lead to growth cracks. Lack of plant food can affect the quality of fresh produce, causing stunted growth or discolouration of leaves, abnormal ripening and a range of other factors. Too much fertilizer can harm the development and post-harvest condition of produce. Good crop husbandry is important for reducing losses. Weeds compete with crops for nutrients and soil moisture.

16. The passage mentions that.....

1. scarce resources such as water result from a waste of human effort
2. there are cases where there is in fact no post-harvest loss at all
3. post-harvest chains cause major losses of horticultural produce
4. growing conditions do not usually match handling at retail level

17. It is stated in the passage that.....

1. 100% losses happen if the market price of harvest is equal to its cost of harvest
2. post-harvest losses are not limited to the way the produce is handled in the soil
3. it is, in most cases, impossible to plough the harvest back into the ground
4. it used to be difficult to measure post-harvest losses for horticultural produce

18. Which of the following is NOT mentioned in the passage in connection with the potential to affect post-harvest losses?

1. 'irrigation'
2. 'fertilisers'
3. 'crop husbandry'
4. 'plant food'

19. The word ‘stunted’ in the passage (underlined) is best related to.....

1. ‘slowed’
2. ‘damaged’
3. ‘stopped’
4. ‘harmed’

20. The best title for the passage is.....

1. Post-Harvest Loss and Its Consequences
2. How to Avoid Post-Harvest Losses
3. Post- and Pre-Harvest Loss
4. Causes of Loss after Harvest

PASSAGE 2

The substances that give chilli peppers their intensity when ingested or applied topically are capsaicin and several related chemicals, collectively called *capsaicinoids*. Capsaicin is the primary ingredient in the pepper spray used as an irritant weapon. When consumed, capsaicinoids bind with pain receptors in the mouth and throat that are responsible for sensing heat. Once activated by the capsaicinoids, these receptors send a message to the brain that the person has consumed something hot. The brain responds to the burning sensation by raising the heart rate, increasing perspiration and release of endorphins. It is now generally accepted that capsaicin alters how the body's cells use energy produced by hydrolysis of ATP. In the normal hydrolysis the SERCA protein uses this energy to move calcium ions into the sarcoplasmic reticulum. When capsaicin is present, it alters the conformation of the SERCA, and thus reduces the ion movement; as a result the ATP energy (which would have been used to pump the ions) is instead released as heat. The "heat" of chilli peppers was historically measured in Scoville heat units (SHU), which is a measure of how much a chilli extract must be diluted in sugar syrup before its heat becomes undetectable to a panel of tasters. Bell peppers rank at 0 SHU, New Mexico green chillies at about 1,500 SHU, jalapeños at 2,500–5,000 SHU, and habaneros at 300,000 SHU. The modern commonplace method for quantitative analysis of SHU rating uses high-performance liquid chromatography to directly measure the capsaicinoid content of a chilli pepper variety. Pure capsaicin is a hydrophobic, colourless, odourless, and crystalline-to-waxy solid at room temperature, and measures 16,000,000 SHU.

21. It is stated in the passage that.....

1. the ingredients in the pepper spray used as irritant weapons contain huge amounts of capsaicin
2. *capsaicinoids* are a group of substances related to the capsaicin derived from chilli and red pepper
3. increasing perspiration is one result of capsaicinoids binding with pain receptors in the mouth and throat
4. chili pepper gives intensity to its substances specially when ingested or applied topically

22. The passage mentions that.....

1. liquid chromatography can measure the capsaicinoid content of the chili pepper
2. capsaicinoids are responsible for producing heat in the pepper spray
3. the brain can get damaged if too much capsaicinoid is consumed
4. SHU is no longer used as a method for measuring “heat” of chilli peppers

23. We may understand from the passage that.....

1. the SERCA reduces ion movement in the absence of capsaicin
2. hydrolysis moves calcium ingredients into the reticulum
3. capsaicin generates energy for the body's cells through hydrolysis
4. habaneros do not perhaps smell as strongly as jalapenos

24. The passage points to the fact that chilli essence.....

1. does not mix with sugar
2. can be dissolved in water
3. is quite easy to produce
4. is between 0 to 300000 SHU

25. The word ‘hydrophobic’ in the passage (underlined) is best related to a substance that.....

1. is nearly shapeless
2. strongly combines with any liquid substance
3. does not easily absorb with water
4. is gaseous state material

PASSAGE 3

Plugs in horticulture are small-sized seedlings grown in trays from expanded polystyrene or polythene filled usually with a peat or compost substrate. This type of plug is used for commercially raising vegetables and bedding plants. Similarly plugs may also refer to small sections of lawn grass sod. After being planted, lawn grass may somewhat spread over an adjacent area. Plug plants are young plants raised in small, individual cells, ready to be transplanted into containers or a garden. Professionally-raised vegetable/flowering plants in controlled conditions during their important formative period can help to ensure plant health and for plants to reach their maximum potential during the harvest/blooming period. Establishing a garden using plug plants is often easier than doing so starting from seed. Planting from plugs reduces the time a crop resides in the ground, and is functional for those with limited space. Plugs can improve yields: a healthy, stocky plant will grow rapidly and symmetrically when planted out, with a potentially greater capacity to withstand pests, disease and drought. Raising some types of seedlings successfully can be difficult, so plug plants can be beneficial for less experienced gardeners. Plug plants are beneficial for gardeners who want to try a new variety or a range of varieties without purchasing numerous packets of seeds and starting the plants from seed. Plug plants are very useful if the sowing window is missed, and plugs can be purchased quickly to replace a crop which has failed. As a garden develops, interplanting existing crops with plug plants, ideally companion plants, can improve the productivity of the space and so maximise harvests – a sown crop may not be able to compete with established plants. Plug plants are much easier to weed than sown seedlings, and weeding will need to be done less frequently.

26. The passage points to the fact that.....

1. plug plants are more resistant to shortage of water
2. bedding plants are more expensive than vegetables plugs
3. polythene is normally filled with a compost substrate
4. plugs refer mainly to small sections of lawn grass sod

27. We understand from the passage that.....

1. experienced gardeners prefer older varieties for better yield
2. less experienced gardeners have to use plugs for success
3. gardens are usually established using plug plants
4. crop failure can be easily taken with plug plants

28. The passage mentions that.....

1. the harvest period is right after the blooming period
2. plugs plants don't have to be planted alone
3. lawn grass spreads far into its adjacent area
4. sown crops are not able to compete with established plants

29. The passage suggests that.....

1. weeding will need to be done less frequently as plants grow
2. several plug plants can be raised in small cell, containers or garden
3. plant health is difficult to maintain in formative period of its growth
4. symmetrical plugs improve healthy, stocky plants for rapid growth

30. The word 'seedling' in the passage (underlined) is closest to a.....

1. group of plants
2. young plant
3. grown seed
4. newly planted seed

میوه کاری

موزهای پختنی (Plantain) از کراس‌های درون گونه‌ای و بین گونه‌ای به وجود آمده‌اند.	-۳۱
M. acuminalos × M. acuminate (۲)	M. acuminate × M. textilis (۱)
M. balbisiana × M. trxtilis (۴)	M. accuminata × M. balbisiana (۳)
فلاینگ دراگون (Flying dragon) سلکسیونی از است که برای از آن استفاده می‌شود.	-۳۲
(۱) نارنج، ایجاد باغ‌های متراکم مركبات	(۲) نارنج، کشت مركبات در خاک‌های شور
(۳) نارنج سه برگ، ایجاد باغ‌های متراکم مركبات	(۴) نارنج سه برگ، کشت مركبات در خاک‌های شور
بزرگترین و مهم‌ترین مشکل لیموترش در جنوب ایران در حال حاضر است.	-۳۳
(۱) بیماری نماتد مولد گره	(۲) بیماری جاروک لیموترش
(۳) بیماری شانکر باکتریای لیمو	(۴) بیماری ویروسی تریستیزا
در مركبات ارقام اغلب باردهی منظمی دارند. شدت سال آوری در نارنگی نسبت به پرتقال است.	-۳۴
(۱) بی‌بذر ، بیشتر	(۲) بذردار، بیشتر
(۳) بی‌بذر، کمتر	(۴) بذردار، کمتر

- ۳۵ در گیاه گل‌ها از نظر ساختاری bisexual هستند اما عملاً به صورت unisexual رفتار می‌کنند. هر گل در یک روز دو بار باز می‌شود، مرتبه اول به صورت گل ماده و مرتبه دوم به صورت گل نر عمل می‌کند.
- (۱) گواوا (۲) پاپایا (۳) آناناس (۴) آووکادو
- ۳۶ عارضه خشکیدگی خوشة خرما است.
- (۱) گرمای بالا و رطوبت نسبی پایین (۲) نامنظم و نامتعادل بودن برنامه تغذیه (۳) تراکم بالای کاشت (۴) شدت نور بالا
- ۳۷ تابستان خنک مشکلات پسته می‌شود.
- (۱) طولانی شدن دوره رشد رویشی و افزایش خطر سرمای زودرس پاییزه (۲) عدم تکامل مغز و تأخیر در زمان رسیدن میوه و در نهایت کاهش محصول (۳) رشد رویش زیاد و طولانی مدت و ممانعت از تشکیل گل (۴) عدم تکامل مغز و زودرس شدن محصول پایه پسته، تحمل سرمای بالاتری در پیوندک القاء می‌کنند.
- ۳۸ (۱) UCBI (۲) آتلانتیکا (۳) اینتگریما (۴) تربینتوس
- تنش خشکی در زمان تمایز یابی جوانه‌های زیتون عارضه به دنبال دارد.
- (۱) سقط گل آذین در جوانه (۲) ناقص شدن برچم‌ها (۳) افزایش تعداد گل در گل آذین (۴) تولید گل آذین‌های کوچک و غیر بارور محصول دوم انجیر Sanpedro با گرده محصول انجیر گرده افشاری می‌شود.
- ۳۹ (۱) Profichi (۲) Mame (۳) Mamoni
- در شرایط دمای کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد از گروه توت‌فرنگی‌ها گل می‌دهند.
- (۱) معمولاً تمام ارقام و گونه‌ها (۲) ارقام روز خنثی (۳) ارقام روز کوتاه
- ۴۰ در چه شرایطی تعداد پاجوش (Branch crown) توت فرنگی افزایش می‌یابد؟
- (۱) با بلند شدن طول روز و دمای پایین در اوایل بهار (۲) با کوتاه شدن طول روز و دمای پایین در اواخر بهار (۳) با کوتاه شدن طول روز و دمای پایین در اوایل پاییز برای تولید توت فرنگی در گلخانه، نسبت نیتروژن به پتاسیم برابر است با نسبت در اوایل رشد و همراه با شروع میوه دهی این نسبت
- (۱) زیاد، کاهش می‌یابد. (۲) کم، افزایش می‌یابد. (۳) زیاد، تغییر نمی‌کند. (۴) پایین، تغییر نمی‌کند.
- ۴۱ از پایه انگور حساس به فیلوکسرا می‌باشد.
- ۴۲ (۱) Vitis riparia (۲) Vitis vinifera (۳) Vitis rupestris (۴) Vitis berlandieri
- در انگورهای با خوشة متراکم (یاقوتی) کاربرد جیبرلیک اسید در زمان توصیه می‌شود.
- (۱) یک بار قبل و سه بار سپس از باز شدن گل‌ها (۲) قبل و پس از باز شدن گل‌ها (۳) پس از باز شدن گل‌ها
- ۴۳ برای شرایط ایران در مجموع کدام روش ترتیب کیوی را ترجیح می‌دهند؟
- (۱) روش پاچراغی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کم است. (۲) روش تربیت T-bar است.
- ۴۴ (۱) روش‌ها تفاوتی با یکدیگر ندارند. (۲) روش پرگولا مناسب‌تر است.
- ۴۵ (۱) روش پاچراغی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کم است. (۲) روش تربیت T-bar است.
- ۴۶ (۱) روش پاچراغی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کم است. (۲) روش تربیت T-bar است.

- ۴۷ گل انگیزی در مناطق گرمسیر ، صورت می‌گیرد.
- (۱) در دمای بالا (۲) با کاهش طول روز (۳) با کاهش شدت نور (۴) با کاهش رشد
- ۴۸ برای جلوگیری از رشد نرک‌ها پس از هرس درختان میوه، هورمون کاربرد دارد.
- (۱) آبalo (۲) IAA (۳) GA (۴) اتیلن
- ۴۹ کدام یک از درختان زیر دارای گل منفرد (Solitary) هستند؟
- (۱) آبلو (۲) تمشک (۳) پسته (۴) هلو
- ۵۰ مشکل اصلی عدم تشکیل میوه زردآلو مناسب چیست؟
- (۱) ماده عقیمی - ناسازگاری - سرمآزادگی بهاره (۲) ماده عقیمی - نر عقیمی - سرمآزادگی زمستانه (۳) نر عقیمی - ناسازگاری - سرمآزادگی پاییزه (۴) پارتونوکاربی - ناسازگاری - عدم تشکیل مناسب گل در تابستان
- ۵۱ کدام یک از پایه‌های درختان میوه زیر شرایط غرقاب (waterlogging) را بهتر تحمل می‌کند؟
- (۱) آلوی میرو بالان (۲) هلوی میسوری (۳) پایه بذری بادام (۴) هیبرید GF677
- ۵۲ مکانیسم اصلی سال آوری سیب کدام مورد است؟
- (۱) ریزش جوانه‌های گل به دلیل رقابت میوه‌های در حال رشد (۲) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل سایتوکینین و آبسیزیک اسید بذرها (۳) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل دریافت نکردن کربوهیدرات کافی (۴) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل تولید جیبرلین در بذرهای میوه
- ۵۳ به چه دلیل، درختان سیب از نظر گستره جغرافیایی، در مناطق بیشتری نسبت به درختان گلابی، پرورش می‌یابند؟
- (۱) تنوع بالاتر رقم و نیاز سرمایی کمتر (۲) حساسیت کمتر به آتشک و نیاز سرمایی کمتر (۳) نیاز سرمایی بیشتر و مقاومت به سرمای بالاتر (۴) مقاومت به سرمای بالاتر و حساسیت کمتر به آتشک در آب و هوای مرطوب
- ۵۴ کدام یک از ترکیبات زیر در باردهی (fruit set) درختان میوه کمتر استفاده می‌شود؟
- (۱) اوره (۲) سولفات آهن (۳) سولفات روی (۴) اسید بوریک
- ۵۵ کدام یک از اهداف اصلاحی زیر در اکثر درختان میوه معتمله مشابه است؟
- (۱) تولید درختانی که در اوخر زمستان یا اوایل بهار زودتر گل می‌دهند (Early flowering) (Late fruit fall). (Late harvest)
- (۲) تولید درختانی که برگ‌های آنها در پاییز دیرتر می‌ریزند.
- (۳) تولید درختانی که پس از کاشت درخت زودتر به بار می‌نشینند. (precocity)
- (۴) تولید درختانی که میوه آنها دیرتر برداشت می‌شود.
- ۵۶ کدام یک از درختان سیب، گیلاس، گلابی و پسته نسبت به گرمای تابستان تحمل بیشتری دارند؟
- (۱) گیلاس (۲) گلابی (۳) پسته (۴) سیب
- ۵۷ کدام یک از موارد زیر باعث ایجاد موج‌های گل دهی می‌شود؟
- (۱) دمای بالا در روز (۲) رشد و نمو سریع شاخه‌ها (۳) سرمآزادگی در اوایل شکوفه دهی (۴) رشد سریع پیش آغازه‌های گل

در چه شرایطی مواد شیمیایی بر طرف کننده خفتگی (نفلیر دور مکس Dormex) در از بین بودن خفتگی موثر می‌باشند؟

-۵۸

- ۱) زمانی که ۷۰٪ نیاز سرمایی تأمین شده باشد.
- ۲) زمانی که ۳۰٪ نیاز سرمایی تأمین شده باشد.
- ۳) زمانی که ۳۰٪ جوانه‌های درخت شروع به رشد کرده باشند.
- ۴) زمانی که ۷۰٪ جوانه‌های درخت شروع به رشد کرده باشند.

-۵۹

در مناطقی با آب و هوای خشک و تابش شدید آفتاب، باید هرس طوری انجام شود که

- ۱) از برخورد مستقیم نور به تنه درخت ممانعت شود یعنی مرکز درختان کاملاً باز نشود.

۲) حداکثر میوه‌ها در بخش‌های میانی و پایین تاج تشکیل شوند تا میزان آفتاب سوختگی سطح میوه کمتر باشد.

۳) حداکثر میوه در بخش‌های بالایی و اطراف تاج تشکیل شوند تا میوه‌ها حداکثر رنگ‌گیری را داشته باشند.

۴) حداکثر نور به بخش‌های مرکزی و پایین تنه برخورد کند یعنی حتماً از روش تربیت و هرس مرکز باز استفاده می‌شود.

-۶۰

تنک گل و میوه در کدام درخت کمترین تأثیر را در بهبود کیفیت میوه آن درخت دارد؟

- ۱) هلو
- ۲) سیب
- ۳) گلابی
- ۴) گیلاس

خاک‌شناسی و گیاه‌شناسی

بیشترین فسفر و آهن قابل جذب، به ترتیب (از راست به چپ) در چه pH‌هایی وجود دارد؟

-۶۱

- ۱) اسیدی - خنثی
- ۲) اسیدی - قلیایی
- ۳) خنثی - اسیدی
- ۴) قلیایی - اسیدی

-۶۲

pH خاک‌های شوری که حاوی مقادیر زیادی املاح KCl و NaCl باشند چگونه است؟

- ۱) اسیدی زیاد
- ۲) قلیائی متوسط
- ۳) خنثی
- ۴) قلیایی زیاد

-۶۳

از دستگاه تانسیومتر چه استفاده‌ای می‌شود؟

۱) برای تعیین دمای خاک

۲) برای تعیین جرم مخصوص حقیقی خاک

۳) تعیین مکش رطوبتی خاک در فشار ۱۵ اتمسفر

۴) تعیین مکش رطوبتی خاک در فشار حدود ۷/۰ تا ۸/۰ اتمسفر

-۶۴

جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاکی به ترتیب ۱۳۷۵ و ۲۶۵ کیلوگرم بر مترمکعب است. درصد تخلخل این خاک چند درصد است؟

- ۱) ۱۵
- ۲) ۲۵
- ۳) ۵۰
- ۴) ۵۲

-۶۵

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) کدام گروه از کانی‌های زیر بیشترین است؟

- ۱) ایلاتیت - کلرایت
- ۲) ایلاتیت - کائولینیات
- ۳) اسمکتایت - ورمی کولايت
- ۴) کائولینیات - کلرایت

-۶۶

کدام یک از علائم زیر معروف افق زیر سطحی تجمع رس است؟

- ۱) B_t
- ۲) AB
- ۳) E
- ۴) B_k

-۶۷

اصطلاح خاک‌های سبک و سنگین مرتبط با کدام ویژگی خاک است؟

- ۱) بافت
- ۲) ساختمان
- ۳) جرم مخصوص حقیقی
- ۴) جرم مخصوص ظاهری

-۶۸

اثر کدام یک از عوامل مؤثر بر تشکیل خاک غالباً با گذشت زمان کاهش می‌یابد؟

- ۱) اقلیم
- ۲) پستی و بلندی
- ۳) مواد مادری
- ۴) پوشش گیاهی

- ۶۹ چوب پنبه‌ای شدن قسمت داخلی سیب و شکاف برداشتن ساقه کرفس می‌تواند به کدام علت باشد؟
- (۱) زیادی عنصر بُر (B)
 - (۲) کمبود عنصر مولیبدن (Mo)
 - (۳) کمبود عنصر بُر (B)
 - (۴) زیادی عنصر مولیبدن (Mo)
- ۷۰ خطر سدیمی شدن خاک در اثر آبیاری با کدامیک از کلاسهاي آب آبیاری بیشتر است؟
- (۱) C_1S_4
 - (۲) C_2S_2
 - (۳) C_4S_2
 - (۴) C_4S_1
- ۷۱ با افزایش pH خاک، جذب یا قابل استفاده بودن کدام گروه از عناصر غذایی افزایش می‌یابد؟
- (۱) Mg, K, Fe
 - (۲) Ca, Mg, Fe
 - (۳) Ca, K, Fe
 - (۴) Ca, Mg, K
- ۷۲ کدامیک از روابط زیر برای تعیین درصد اشباع بازی بکار می‌رود؟
- $$\frac{\text{بازهای قابل تبادل}}{\text{CEC}} \times 100$$
- $$\frac{\text{بازهای محلول}}{\text{CEC}} \times 100$$
- (۱)
 - (۲)
- ۷۳ بافت خاک عبارت است از:
- $$\frac{\text{CEC}}{\text{بازهای محلول}} \times 100$$
- $$\frac{\text{CEC}}{\text{بازهای قابل تبادل}} \times 100$$
- (۱) درصد حجمی ذرات شن - سیلت و رس
 - (۲) درصد نسبی ذرات شن - سیلت و رس
 - (۳) درصد وزنی ذرات شن - سیلت و رس
 - (۴) مجموع درصد حجمی و وزنی ذرات مذکور
- ۷۴ خاک‌های اسیدی به احتمال زیاد در کدام رده قرار می‌گیرند؟
- (۱) مالی‌سول‌ها
 - (۲) الفی‌سول‌ها
 - (۳) اریدی‌سول‌ها
 - (۴) اسپودوسول‌ها
- ۷۵ معمولاً با افزایش واکنش (pH) خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در غالب خاک‌ها اینگونه تغییر می‌نماید:
- (۱) کاهش می‌یابد.
 - (۲) افزایش می‌یابد.
 - (۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
 - (۴) بدون تغییر است.
- ۷۶ لایه درون پوست (آنودردم) در کدام دسته از گیاهان زیر مشخص تر است؟
- (۱) ریشه تک لپهایها
 - (۲) ریشه دولپهایها
 - (۳) ساقه تک لپهایها
 - (۴) ساقه دولپهایها
- ۷۷ هرگاه در بافت کلانشیم (Collenchyme)، یاخته‌ها (Colloctytes) یا خانه‌ها (Mea) توسط متأ (Colloctytes) از هم جدا باشند و فقط اطراف متأ دیوار یاخته‌ها ضخیم شده باشد، مانند کلانشیم ساقه تاتوره (Datura) این نوع کلانشیم چه نامیده می‌شود؟
- (۱) ساده
 - (۲) گرد یا حلقوی
 - (۳) زاویه‌دار یا گوش‌دار
 - (۴) روفه‌ای با مطبق
- ۷۸ فرآورده نهایی گلیکولیز چه نام دارد؟
- (۱) گلیسرآلدئید تری فسفات
 - (۲) اسید پیروویک
 - (۳) فروکتوز
 - (۴) گلوكز
- ۷۹ در گیاهان تنفس نوری در کدامیک از شرایط زیر شروع می‌شود؟
- (۱) با کاهش فشار اکسیژن
 - (۲) با افزایش درجه حرارت
 - (۳) با کاهش شدت نور
 - (۴) با افزایش فشار گاز کربنیک
- ۸۰ رنگ نارنجی درون پرتقال رسیده مربوط است به است.
- (۱) آناناس
 - (۲) انجیر
 - (۳) کیوی
 - (۴) موز
- ۸۱ حلقه کاسپاری (Casparian strip) که در بعضی گیاهان وجود دارد در کدام اندام گیاه دیده می‌شود؟
- (۱) ریشه
 - (۲) ساقه
 - (۳) برگ
 - (۴) میوه
- ۸۲ اتیلن در گلدهی کدام گیاه تأثیرگذار است؟
- (۱) آناناس
 - (۲) انجیر
 - (۳) کیوی
 - (۴) موز

- ۸۳ آنزیم‌هایی که انتقال مواد معدنی به درون و به خارج از پروتوبلاسم را کنترل می‌کنند، عمدتاً در چه بخشی از سلول جای دارند؟
- (۱) سیتوپلاسم (۲) میتوکندری (۳) غشاء کلربلاست (۴) غشاء سیتوپلاسمی
- ۸۴ واژه پتانسیل اسمزی متراffد کدامیک از این واژه‌ها است؟
- (۱) فشار اسمزی (۲) پتانسیل فشاری (۳) پتانسیل مکش (۴) فشار تورژسانس
- ۸۵ حرکت جانبی آب در ساقه بوسیله کدامیک از این بافت‌ها صورت می‌گیرد؟
- (۱) آوندهای چوبی (۲) آوندهای آبکش (۳) اشعه آوند چوب (۴) آوندهای آزاد، هم در آوندهای چوبی و هم در آوندهای آبکش صورت می‌گیرد؟
- ۸۶ انتقال کدامیک از این هورمون‌ها به طور کاملاً آزاد، هم در آوندهای چوبی و هم در آوندهای آبکش صورت می‌گیرد؟
- (۱) اکسین‌ها (۲) زیبرلین‌ها (۳) سیتوکینین‌ها (۴) اتیلن و مواد مشابه آن
- ۸۷ در کدامیک از این گیاهان روز بلند با یک چرخه القایی، می‌توان طرح اولیه گل را بوجود آورد؟
- (۱) شبیت (۲) سیلن (۳) چشم (۴) بارهنگ
- ۸۸ واژه فلودرم در مورد کدامیک از این بافت‌ها به کار می‌رود؟
- (۱) مجموع پارانشیم پوستی و آبکش ثانویه (۲) مجموع پارانشیم پوستی و چوب پنبه (۳) آبکش ثانویه (۴) پارانشیم پوستی
- ۸۹ سلول‌های ریشه‌زا در چه محلی قرار دارند؟
- (۱) در آندودرم (۲) در سلول‌های پوست ریشه (۳) در خارجی‌ترین لایه استوانه مرکزی (۴) در استوانه مرکزی بین دسته‌های آوندهای آبکش و آوندهای چوب
- ۹۰ در سلول‌های کدامیک از این بافت‌ها، کلربلاست وجود دارد؟
- (۱) اسکلرانشیم (۲) آئرانشیم (۳) کلرانشیم (۴) کلانشیم

از دید نباتات

- ۹۱ کدام یک از ویژگی‌های پرلایت نمی‌باشد؟
- (۱) جذب آب تا ۴ برابر وزن (۲) ظرفیت تبادل کاتیونی بالا (۳) استریل بودن (۴) pH برابر با ۶ تا ۸ به طور معمول بیشتر از کدام ترکیب برای گندزدایی نمونه‌ها در کشت بافت گیاهی استفاده می‌شود؟
- (۱) کلرید کلسیم (۲) کلرید چیوه (۳) کلرaks (۴) الکل بالاترین مقدار سایتوکاینین در طی مراحل تکامل بذر در کدام مرحله است؟
- (۱) تکثیر سلولی و تمایزیابی (۲) ذخیره‌سازی (۳) تمایزیابی سلولی و خشک شدن (۴) تکثیر سلولی و ذخیره‌سازی
- ۹۴ کدام حالت زیر در گیاهانی که خودناسازگاری دارند باعث بروز این پدیده می‌شود؟
- (۱) یکپایگی (۲) دو پالگی (۳) ناهمرسی (۴) آلل‌های S

- ۹۵ بذرهایی که برای جوانهزنی در برابر سرما واکنش نشان می‌دهند اما نیاز مطلق به سرما ندارند دارای چه نوع خفتگی هستند و در چه گونه‌های گیاهی دیده می‌شوند؟
- (۱) میان خفتگی - سوزنی برگان
 - (۲) میان خفتگی - پهن برگان
 - (۳) فیزیولوژیکی - سوزنی برگان
- ۹۶ برداشت زودتر بذر در کدام یک از حالات زیر انجام می‌گیرد؟
- (۱) در مورد میوه‌های گوشتی برای جلوگیری از فساد بذر
 - (۲) در مورد بذرهای حساس قبل از جوانهزنی بذر
 - (۳) در مورد میوه‌های خشک قبل از پخش بذر آنها
- ۹۷ رکود درون زاد بذر ناشی از کدام یک از حالات زیر است؟
- (۱) مواد بازدارنده در تخمکپوش
 - (۲) پوسته غیرقابل نفوذ
 - (۳) جنبین‌های نابالیده
- ۹۸ Paradormancy را می‌توان تا حدودی متفاوت با کدام واژه در نظر گرفت؟
- (۱) Exodormancy
 - (۲) Endodormancy
 - (۳) Physical dormancy
- ۹۹ برای آزمون خلوص بذر از کدام یک از روش‌های زیر استفاده می‌شود؟
- (۱) انکوباسیون بذر
 - (۲) پیری تسریع شده
 - (۳) نشت یونی
 - (۴) فوتیپ بذر
- ۱۰۰ در بذرهای تک لپه‌ای، لپه کدام یک از اجزاء زیر است؟
- (۱) Coleoptile
 - (۲) Coleorrhiza
 - (۳) Plumule
 - (۴) Scutellum
- ۱۰۱ کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد تقسیم‌بندی بذور صحیح است؟
- (۱) بذور آندوسپرمی بر اساس مورفولوژی جنبین و بذور غیرآندوسپرمی بر اساس نوع پوشش بذور تقسیم می‌شوند.
 - (۲) بذور آندوسپرمی بر اساس نوع پوشش بذر و بذور غیرآندوسپرمی بر اساس مورفولوژی جنبین تقسیم می‌شوند.
 - (۳) بذور آندوسپرمی و غیرآندوسپرمی بر اساس مورفولوژی جنبین تقسیم می‌شوند.
 - (۴) بذور آندوسپرمی و غیرآندوسپرمی بر اساس نوع پوشش بذر تقسیم می‌شوند.
- ۱۰۲ بذور در مرحله تکاملی رسیدن و خشک شدن، کدام یک از حالات زیر را دارا می‌باشدند؟
- (۱) فقط بذرهای زنده‌زا به صورت خاموش می‌باشند.
 - (۲) یا به صورت خفته و یا به صورت خاموش می‌باشند.
 - (۳) بذور در این مرحله به صورت خاموش می‌باشند.
 - (۴) بذور در این مرحله به صورت خفته می‌باشند.
- ۱۰۳ پدیده چند جنبی (Polyembryony) در کدام یک از گیاهان زیر مشاهده می‌شود؟
- (۱) پسته
 - (۲) گیلاس
 - (۳) انگور
 - (۴) پرتقال
- ۱۰۴ کدام یک از حالات زیر به عنوان منبع بهتری برای تهیه بذر درختان جنگلی مطلوب‌تر است؟
- (۱) انتخاب اکوتبیپ Family selection
 - (۲) انتخاب فامیلی Ecotype selection
 - (۳) درختان پلاس Plus trees
 - (۴) انتخاب کلاین Cline selection
- ۱۰۵ کدام حالت زیر در مورد انتخاب قلمه از گیاه مادری اولویت ندارد؟
- (۱) قلمه از قسمت‌های نونهال تهیه شود.
 - (۲) در حالت فیزیولوژیکی مناسبی باشد.
 - (۳) عاری از عوامل بیماریزا باشد.
- ۱۰۶ کدام یک جزء دلایل استفاده از «تکثیر رویشی» محسوب نمی‌شود؟
- (۱) کنترل مراحل رشد در تکثیر گیاه
 - (۲) کوتاه کردن زمان رسیدن زایشی
 - (۳) هزینه تکثیر کمتر برای هر گیاه در مقایسه با تکثیر بذری
 - (۴) ترکیب بیش از یک نژادگان در یک گیاه

- ۱۰۷ قلمه‌های گرفته شده از شاخه‌های دارای رشد افقی برخی گونه‌ها، به صورت افقی به رشد خود ادامه می‌دهند. این پدیده اصطلاحاً نامیده می‌شود.
- (۱) Cyclophysis (۴) (۲) Ontogenesis (۳) (۳) Plagiotropism (۲) (۴) Orthotropism
- ۱۰۸ می‌خواهیم ۱۰۰ میلی‌لیتر از ماده تنظیم کننده رشد اکسین برای ریشه‌زایی قلمه‌ها به غلظت ۲۰۰۰ ppm درست کنیم. مقدار هورمون موردنیاز چند گرم است؟
- (۱) ۲/۵ گرم (۲) ۲ میلی‌گرم (۳) ۲ میلی‌گرم (۴) ۲۰۰۰ میلی‌گرم
- ۱۰۹ در کدام نوع از پیوندهای زیر، پیوند کفاقت چوب است؟
- (۱) پیوند اسکنه (۲) پیوند نیمانیم (۳) پیوند جانبی (۴) پیوند وصله‌ای
- ۱۱۰ در کدام نوع از بافت ناهمسانی‌های زیر یک بافت با یک نزادگان به صورت لایه نسبتاً نازکی کاملاً یک قسمت درونی را که از نظر زنتیکی متفاوت است می‌پوشاند؟
- (۱) پارفرابوش (۲) نافرابوش (۳) فرابوش (۴) پاره‌ای
- ۱۱۱ در یک گیاه و نهال بالغ قسمت بیرونی تاج از نظر سن مسن ترین بخش گیاه است اما از نظر سن جوان‌ترین قسمت می‌باشد.
- (۱) بیولوژیک (Biologic) - کرونولوژیک (Chorono logic) (۲) کرونولوژیک (Chorono logic) - بیولوژیک (Biologic) (۳) بیولوژیک (Biologic) - اونتوژنتیک (Ontogenetic) (۴) بیولوژیک (Heteroblasty) به چه مفهوم است؟
- ۱۱۲ (۱) عدم واکنش مریستم انتهایی به حرکت‌ها برای آغازیدن گلدهی در دوره نونهالی
 (۲) امکان تغییر الگوهای ابی‌زنیکی یا زنیکی با بهنژادی و گزینش
 (۳) دارا بودن برخی ویژگی‌های متفاوت در محیط‌های رشد گوناگون
 (۴) تغییرات ناگهانی و با تفاوت‌های مشخص بین دو مرحله نونهالی و بلوغ وجود کدام زیر روی قلمه حتماً برای ریشه‌دار شدن قلمه ساقه ضروری است؟
- (۱) دم برگ (۲) جوانه (۳) برگ (۴) گل
- ۱۱۳ پیوند ریشه پرستار «Nurse-root grafting» برای چه هدفی به کار می‌رود؟
- (۱) برای ایجاد فرصت کافی جهت ریشه‌دار شدن پیوند (۲) برای تسهیل جابجایی درختان پیوند شده
 (۳) برای نجات پایه درختانی که در معرض خطر هستند. (۴) برای افزایش عمر درختان پیوندی
- ۱۱۴ در گیاهان علفی، تشکیل آغازنده‌های ریشه معمولاً از کدام یاخته‌ها صورت می‌گیرد؟
- (۱) پرتوهای آوندی مغز (۲) لایه زاینده زیرپوست (۳) یاخته‌های نزدیک به دسته‌های آوندی
- ۱۱۵ طول نیساگ‌های (Rhizome) موجود در یک گیاه چگونه افزایش می‌باید؟
- (۱) با تقسیم و رشد سلولی در کامبیوم ساقه (۲) با تقسیم و رشد سلولی در مریستم انتهایی ساقه
 (۳) با رشد مریستم اینترکالاری در قسمت پایین میانگرهای (۴) با رشد مریستم انتهایی و مریستم‌های میان گره‌ها
- ۱۱۶ علت استفاده از قلمه‌های پاشنه‌دار در مقایسه با قلمه‌های شاخه‌های یکساله چیست؟
- (۱) وجود مواد ذخیره‌ای بیشتر در چوب‌های مسن و استحکام بیشتر
 (۲) وجود آغازنده‌های ریشه از پیش تشکیل شده و مواد ذخیره‌ای بیشتر
 (۳) وجود آغازنده‌های ریشه حاصل از زخم و مواد فنلی بیشتر
 (۴) وجود مواد فنلی بیشتر در چوب‌های مسن و قطر بیشتر

- ۱۱۸ کندکننده‌های رشد چگونه باعث افزایش ریشه‌دهی می‌شوند؟
- (۱) ضد جیرالین بودن و افزایش رشد شاخصاره
 - (۲) کاهش رقابت مواد غذایی و همسازی با اکسین
 - (۳) کاهش رشد شاخصاره و ضد جیرالین بودن
 - (۴) افزایش رشد شاخصاره و همسازی با اکسین
- در کدام یک از روش‌های تکثیر از طریق قلمه جهت افزایش کارایی تکثیر از تیمار هورمونی سایتوکینین استفاده می‌گردد؟
- (۱) قلمه‌های چوب نرم
 - (۲) قلمه‌های جوانه برگ
 - (۳) قلمه‌های برگ
 - (۴) قلمه چوب سخت
- در صورتی که پایه مادری شیره زیادی تولید کند، کدام کوپیوند مناسب‌تر است؟
- (۱) کوپیوند T و ازگون
 - (۲) کوپیوند وصله‌ای
 - (۳) کوپیوند T
 - (۴) کوپیوند قاشی

فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

- ۱۲۱ اگر طول بحرانی شب در گیاهی روز کوتاه، ۱۵ ساعت باشد، کدام یک از چرخه‌های نوری زیر مانع از گلدهی آن می‌شود؟
- (۱) ۸ ساعت نور، ۸ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۸ ساعت تاریکی
 - (۲) ۶ ساعت نور، ۲ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۱۶ ساعت تاریکی
 - (۳) ۲ ساعت نور، ۲۰ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز دور، ۲ ساعت تاریکی
 - (۴) ۸ ساعت نور، ۱۶ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز دور، ۲ ساعت تاریکی
- کارایی مصرف آب به ترتیب از راست به چپ در گیاهان آگاو، ذرت و گوجه فرنگی
- (۱) افزایش می‌یابد.
 - (۲) کاهش می‌یابد.
 - (۳) تفاوتی ندارد.
 - (۴) بسته به مرحله رشد گیاه متفاوت است.
- ۱۲۲ باکتری‌های ریزوپیوم، مسئول فرآیند تبدیل به می‌باشد.
- (۱) نیتریت (NO_2^-)، نیترات (NO_3^-)
 - (۲) آمونیوم (NH_4^+)، نیترات (NO_3^-)
 - (۳) ازت مولکولی (N_2)، آمونیوم (NH_4^+)
 - (۴) ازت آلی، آمونیوم (NH_4^+)
- ۱۲۳ خروج Na^+ از سلول توسط و ورود یون نیترات (NO_3^-) و اسیدهای آمینه به سلول از طریق صورت می‌گیرد.
- (۱) آنتیبورتر $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ ، سیمپورترهای پروتونی خاص
 - (۲) سیمپورترهای پروتونی خاص، آنتیبورتر $\text{Na}^+ - \text{H}^+$
 - (۳) سیمپورترهای پروتونی خاص، سیمپورترهای پروتونی خاص
 - (۴) آنتیبورتر $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ ، سایر آنتیبورترهای خاص

- ۱۲۴ اگر از مکش ناشی از تبخیر تعرق برگ‌ها صرف نظر شود، در آوندی به شعاع ۲۵ میکرومتر، آب تقریباً تا ارتفاع سانتی‌متر به صورت کاپیلاری صعود می‌کند؟
- (۱) ۰/۶
 - (۲) ۶
 - (۳) ۶۰۰
 - (۴) ۶۰

- ۱۲۵ کسر تنفسی در اکسیداسیون اسید استئارین چقدر است؟
- (۱) ۰/۷
 - (۲) ۱/۲
 - (۳) ۱/۶
 - (۴) ۱
- ۱۲۶ اگر سلولی دارای پتانسیل اسمزی ۱۲- بار و پتانسیل فشار ۴- بار باشد، پتانسیل آب آن سلول در فشار یک بار اتمسفر، چقدر است؟
- (۱) ۷- بار
 - (۲) ۸- بار
 - (۳) ۱۶- بار
 - (۴) ۱۷- بار

- ۱۲۸ قسمت اعظم آنیون هایی که برای ایجاد تعادل بار الکتریکی ناشی از ورود یون پتاسیم به درون سلول های محافظ روزنه لازم است از جانب اسید آلی تامین می شود.
- (۱) پیروات (۲) سیترات (۳) کلر (۴) ملات
- ۱۲۹ در مسیر فتوسنتزی CAM، CO_2 لازم جهت انجام فرایند فتوسنتز، از منبع تامین می شود.
- (۱) هوا (۲) تنفس سلولی (۳) CO_2 محلول در آب (۴) دکربوکسیلاسیون ملات
- ۱۳۰ کدام جمله در ارتباط با کلروفیل فلورسانس صحیح نمی باشد؟
- (۱) با استفاده از آن می توان مقدار گرمای ناشی از تابش نور به گیاه را محاسبه کرد.
- (۲) طیف نوری کلروفیل فلورسانس شبیه طیف نوری جذب شده است.
- (۳) با استفاده از آن می توان راندمان فتوشیمی گیاه را محاسبه کرد.
- (۴) مقدار نور حاصل از آن بسیار کمتر از کل نور جذب شده است.
- ۱۳۱ هنگام باز شدن روزنه در گیاهان، و از سلول های محافظ رخ می دهد.
- (۱) ورود Cl^- و خروج ملات (۲) ورود K^+ و خروج Na^+
- (۳) ورود H^+ و خروج K^+ (۴) خروج H^+ و ورود K^+
- ۱۳۲ کدام یک از جملات زیر درباره نور و جذب آن توسط رنگدانه ها، صحیح نمی باشد؟
- (۱) کلروفیل به طور مؤثری، طول موج های نور آبی و قرمز را جذب می کند.
- (۲) جذب یک فوتون نور آبی در مقایسه با نور قرمز، کلروفیل را به سطح پرانرژی تری می رساند.
- (۳) به جذب نور توسط رنگدانه ها که تابعی از طول موج نور است، طیف عمل (Action Spectrum) اطلاق می شود.
- (۴) هنگامی که یک فوتون نور توسط مولکول کلروفیل جذب می شود، مولکول کلروفیل به حالت برانگیخته درمی آید.
- ۱۳۳ در صورتی که pH داخل سلول گیاهی افزایش یابد یون های آلی می شوند.
- (۱) پیروات تجزیه (۲) پیروات ساخته (۳) ملات تجزیه (۴) ملات ساخته
- ۱۳۴ عنصر نیکل (Ni) در آنزیم گیاهی وجود دارد.
- (۱) α - amylase (۲) Peroxidase (۳) Catalase (۴) Urease
- ۱۳۵ تبدیل دو مول ۳ - فسفوگلیسرات به ۲ مول گلیسرآلدئید تری فسفات در چرخه کلوین، نیازمند مول ATP و مدل NADPH است.
- (۱) ۱۸ ، ۲ (۲) ۶ ، ۶ (۳) ۶ ، ۹ (۴) ۲۰ ، ۲
- ۱۳۶ کدام مواد فنلی، باعث طعم تلخ گریپ فروت می گرددند؟
- (۱) Limonene و Naringenin (۲) Hesperetin و Limonene (۳) Hesperetin و Naringenin (۴) تجمع اسیدهای فنلی ساده
- ۱۳۷ در سرخانه های کنترل اتمسفر، کاربرد ندارد.
- (۱) سیستم تکترول (Tectrol system) (۲) سیستم تصفیه (Purge system) (۳) سیستم گردشی (Recirculation system) (۴) کیسه انبساط (Expansion bag)
- ۱۳۸ چه رابطه ای بین ترکیبات فنلی با شاخص های کیفی میوه ها و سبزی ها وجود دارد؟
- (۱) اکسیداسیون آنزیمی ترکیبات فنلی باعث افزایش کیفیت میوه ها و سبزی ها می شود.
- (۲) ترکیبات فنلی در ایجاد رنگ مطلوب برای میوه ها و سبزی ها موثر هستند.
- (۳) ترکیبات فنلی باعث افزایش حساسیت به تنش های اکسیداتیو می شوند.
- (۴) ترکیبات فنلی باعث اکسیداسیون آسکوربیک اسید در میوه ها و سبزی ها می شوند.

- ۱۳۹ علت عارضه فیزیولوژیکی قهقهه‌ای شدن مغز سیب درختی کدام است؟
- (۱) انباشته شدن اسکوربیک اسید اکسیداز در مغز سیب
 - (۲) کاهش میزان اکسیرن در مغز سیب درختی
 - (۳) انباشته شدن اسید سوکسینیک در بافت
 - (۴) انباشته شدن پیروات در بافت
- بر اساس نوع اسیدهای چرب، محصول در شرایط طبیعی ماندگاری کمتری دارد.
- ۱۴۰ ۱) پسته ۲) پکان ۳) گرد و ۴) فندق
- ۱۴۱ تکنیک استفاده از مواد جاذب اتیلن، جهت جلوگیری از تولید گاز اتیلن و کاهش صایعات محصولات با غسانی را می‌نامند.
- | | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| Curing (۴) | Chilling (۳) | Scrubbing (۲) | Precooling (۱) |
| اسید غالب در کاهو و گوجه‌فرنگی، به ترتیب و می‌باشد. | ۱) مالیک، سیتریک ۲) مالیک، مالیک ۳) اگزالیک، مالیک ۴) سیتریک، سیتریک | | |
- ۱۴۲ ترکیبات و به عنوان نخستین مواد شیمیایی موثر در جهت کنترل پوسیدگی مرکبات استفاده می‌شوند.
- | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Borax (۴) | Biphenyl , SOPP (۳) | HOPP , SOPP (۲) | TB2 , Borax (۱) |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|
- ۱۴۳ فرمول ضریب حرارتی به ازای تغییرات دمایی، کدام یک از فرمول‌های زیر می‌باشد؟
- $$Q_{10} = (R_1 / R_2)^{10/(t_2-t_1)} \quad (1)$$
- $$Q_{10} = (R_2 / R_1)^{10/(t_2-t_1)} \quad (2)$$
- $$Q_{10} = (R_2 - R_1)^{10/(t_1+t_2)} \quad (3)$$
- $$Q_{10} = (R_2 + R_1)^{10/(t_2-t_1)} \quad (4)$$
- ۱۴۴ دمای بحرانی که باعث اندوخته شدن قند در سیب زمینی و سیب زمینی شیرین می‌شود برحسب $^{\circ}\text{C}$ کدام است؟
- ۱۴۵ ۱) ۱۰ و ۱۵ ۲) ۱۵ و ۲۰ ۳) ۱۵ و ۲۰ ۴) ۱۰ و ۱۵
- ۱۴۶ مهم‌ترین ترکیب فرار در میوه نارنگی و پرتقال می‌باشد.
- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| ۱) متیل آترانیلات و تیمول | ۲) متیل بوتیرات | ۳) هنگزانول | ۴) هنگزانول |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|
- ۱۴۷ آنزیم PG باعث نرم شدن بافت میوه در زمان رسیدن می‌شود.
- | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| ۱) با هیدرولیز اتصال‌های (۴)-α اسید گالاکترونیک در پکتین‌ها | ۲) با هیدرولیز اتصال‌های (۴)-β اسید گالاکترونیک در پکتین‌ها | ۳) با جلوگیری از عمل اتیلن در رسیدن میوه | ۴) با هیدرولیز نشاسته در بافت میوه |
|---|---|--|------------------------------------|
- ۱۴۸ کدام یک از میوه‌های زیر دیرتر به اوج فرازگرا می‌رسد؟
- | | | | |
|--------|--------|----------|------------|
| ۱) موز | ۲) سیب | ۳) گلابی | ۴) آواکادو |
|--------|--------|----------|------------|
- ۱۴۹ کدام یک از موارد زیر در مورد لکه‌تلخ صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) محلول پاشی با کلوروکلسیم، باعث کاهش لکه‌تلخ در سیب می‌شود.
 - (۲) رقم گرانی اسمیت به لکه‌تلخ حساس است.
 - (۳) میوه‌های نارس، به لکه‌تلخ حساس‌تر هستند.
 - (۴) میوه‌های سیب بزرگتر، به لکه‌تلخ حساس‌تر هستند.
- ۱۵۰ کدام یک از ترکیبات زیر ممکن است از چرخه تنفس هوایی خارج شود؟
- | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------------|
| Citrate (۴) | Malate (۳) | Succinate (۲) | Oxaloacetate (۱) |
|-------------|------------|---------------|------------------|

- ۱۵۱ یک مسئله عمده در مورد استفاده از بذر حقیقی سیبزمینی چیست؟
 ۱) انبارداری این ارقام ضعیف است.
 ۲) بیماری‌های ویروسی از طریق بذر حقیقی منتقل می‌شود.
 ۳) عملکرد ارقامی که فعلاً با بذر حقیقی تکثیر می‌شوند کم است.
 ۴) در اثر کاشت بذر حقیقی محصول زودرس می‌شود.
- ۱۵۲ وجود کدام‌یک از مواد زیر موجب تیره شدن رنگ (واکنش Mailard) در فرآورده‌های سرخ کردنی یا چیپس سیبزمینی می‌شود؟
 ۱) نشاسته زیاد
 ۲) ماده خشک زیاد
 ۳) مواد معدنی زیاد
 ۴) گلکز و فروکتوز زیاد
- ۱۵۳ علت عدم رشد و ریزش غلاف‌ها در لوبیا سبز چیست؟
 ۱) هوای بسیار گرم و خشک و شرایط وزش باد زیاد
 ۲) آبیاری زیاد و هوای سرد
 ۳) آبیاری کم و هوای گرم
 ۴) آبیاری کم و هوای گرم
- ۱۵۴ کدام عبارت صحیح می‌باشد؟
 ۱) آندیو گیاهی خود گشن می‌باشد.
 ۲) شیکوره گیاهی خودگشن می‌باشد.
 ۳) آندیو و شیکوره هر دو خودگشن می‌باشد.
 ۴) آندیو و شیکوره هردو دگرگشن می‌باشد.
- ۱۵۵ کدام گزینه درباره بولتینگ و ظهور ساقه گلدهنده پیاز صحیح می‌باشد؟
 ۱) بولتینگ پیاز بیشتر متاثر از فتوپریود است تا دما
 ۲) قطر گلوبی کمتر از ۱۶ میلی‌متر به بولتینگ حساس نخواهد بود.
 ۳) مناسب‌ترین دما در القا بولتینگ دمای بین ۱۰ - ۵ درجه سانتی‌گراد است.
 ۴) دمای پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد موجب تسریع بولتینگ می‌شود.
- ۱۵۶ یکی از علل سفیدشدن بافت گوشت میوه گوجه فرنگی چیست؟
 ۱) زیادی پتاسیم
 ۲) کمبود پتاسیم
 ۳) زیادی کلسیم
 ۴) کمبود کلسیم
- ۱۵۷ کدام‌یک از اندام‌های زیر منشأ تشكیل اندام خوراکی در سبزی Brassica oleraceae var. gongylodes است؟
 ۱) ساقه
 ۲) ریزوم و ریشه
 ۳) ریشه و هیپوکوتیل
 ۴) هیپوکوتیل و ریزوم
- ۱۵۸ اگر موقع انتقال نشاء‌های کلم‌چینی از شاسی به مزرعه اندازه آنها بزرگ یا مسن شده باشند چه مشکلی پیش می‌آید؟
 ۱) گلدهی به تأخیر می‌افتد.
 ۲) اکثر نشاء‌ها از بین خواهد رفت.
 ۳) رشد سریعتر و محصول پیش رس می‌شود.
 ۴) رکود در رشد گیاه حاصل شده و خطر به گل رفتن افزایش خواهد یافت.
- ۱۵۹ بخش خوراکی کلم تکمه را چه می‌نامند؟
 ۱) Clove (۴)
 ۲) Head (۳)
 ۳) Sprout (۲)
 ۴) Curd (۱)
- ۱۶۰ کدام‌یک از سبزی‌های زیر دارای مجموع حرارتی کمتری برای جوانه‌زنی بذر هستند؟
 ۱) Lactuca sativa (۲)
 ۲) Pisum sativum (۱)
 ۳) Lycopersicon esculentum (۴)
 ۴) Lepidium sativum (۳)
- ۱۶۱ علت اصلی افزودن ملاس چغندر قند به کمپوست قارچ دکمه‌ای چیست؟
 ۱) کاهش pH
 ۲) افزایش pH
 ۳) افزایش $\frac{C}{N}$
- ۱۶۲ هدف اصلی کاربود مالچ‌های پلاستیکی سیاه رنگ در هندوانه چیست؟
 ۱) تولید محصول تمیزتر
 ۲) زودرس شدن محصول
 ۳) کاهش مشکل علف‌های هرز

- ۱۶۳ کدام یک از روش‌های زیر برای کنترل بیماری فتق ریشه کلم (club root) مؤثر نمی‌باشد؟
- ۱) ضد عفونی نشاها با قارچ کش
 - ۲) کشت در زمین‌های دارای pH قلیابی
 - ۳) تناوب کاشت با محصولات غیر حساس
 - ۴) پیوند بر روی پایه‌های مقاوم به قارچ عامل این بیماری
- ۱۶۴ خاک دادن بوته‌های ترمه‌فرنگی و کرفس برای چیست؟
- ۱) سرپا نگهدارشتن بوته‌ها
 - ۲) افزایش ریشه‌دهی و در نتیجه افزایش عملکرد
 - ۳) جلوگیری از حمله جوندگان به قسمت‌های مصرفی این دو محصول
 - ۴) روش شدن رنگ (کاهش تجمع کلروفیل) و افزایش کیفیت محصول
- در کدام یک از سبزیجات زیر، کاشت عمیق نشاء جایز نمی‌باشد؟
- ۱۶۵
- ۱) کلم گل
 - ۲) کرفس
 - ۳) تره فرنگی
 - ۴) گوجه فرنگی
- کدام دسته از گیاهان زیر دارای گل‌های مقاوم‌تری به سرما هستند؟
- ۱۶۶
- ۱) سیلن - بنفسه - همیشه بهار
 - ۲) سیلن - همیشه بهار - قرنفل
 - ۳) بنفسه - همیشه بهار - تاج الملوك
 - ۴) تاج الملوك - همیشه بهار - قرنفل
- تولید گیاهان هاپلوفید در گل‌های زینتی به چه منظوری است؟
- ۱۶۷
- ۱) به منظور تولید گیاهان عاری از ویروس
 - ۲) گیاهان کوچک‌تر که در گلکاری کاربرد دارند.
 - ۳) برای تولید گیاهان کاملاً همگن و یکنواخت
 - ۴) برای تولید گیاهان با کیفیت برتر
- کدام دو محصول زیر از محصولات مهم گل در فصل زمستان می‌باشند؟
- ۱۶۸
- ۱) گل حنا - جعفری آفریقایی
 - ۲) گل ناز - جعفری فرانسوی
 - ۳) مینا یکساله - گل تکمه‌ای
 - ۴) شاه‌پسند - نازیخی
- کدام دو محصول زیر از محصولات مهم گل در فصل زمستان می‌باشند؟
- ۱۶۹
- ۱) رز و جعفری
 - ۲) به زپنی و میخک
 - ۳) میناچمنی و یاس زرد
- زمان برداشت گل زربرا و گلابیول به ترتیب است.
- ۱۷۰
- ۱) باز شدن گل‌های لوله‌ای - باز شدن دو گلچه بالائی
 - ۲) باز شدن گل‌های زبانه‌ای - باز شدن کامل ۳ گلچه پائینی
 - ۳) باز شدن ۲ ردیف بیرونی گل‌های لوله‌ای و نمایان شدن گرده - رنگ انداختن بیش از دو گل پائینی
 - ۴) باز شدن کامل گل‌های لوله‌ای و نمایان شدن گرده در گل‌های زبانه‌ای - رنگ انداختن دو گلچه میانی و باز شدن چهار گلچه پائینی
- تعداد و طول میانگره‌ها به ترتیب از راست به چپ وابستگی زیادی به دارد.
- ۱۷۱
- ۱) DIF و ADT
 - ۲) ADT و DIF
 - ۳) ADT و ADT
 - ۴) DIF و DIF
- از چمن‌های بسیار مناسب کشت در ساحل دریاها با آب شور می‌باشد.
- ۱۷۲
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| Seashore Paspalum (۲) | Seashore Cynodon (۱) |
| Seashore Buchloe (۴) | Seashore Zoysia (۳) |
- در محدوده تحمل دمایی گل‌های یک ساله، دمای پاییش سبب می‌شود.
- ۱۷۳
- ۱) کوتاه و ضخیم شدن ساقه‌ها
 - ۲) بلند و باریک شدن ساقه‌ها
 - ۳) کوتاه و باریک شدن ساقه‌ها
 - ۴) کوتاه و ضخیم شدن ساقه‌ها

- ۱۷۴ در سوخهای بهار گل، استراحت سوخ در چه شرایطی رخ می‌دهد؟
- ۱) خشکی خاک و دمای بالای پایین هوا
 - ۲) دمای بالای هوا و خشکی خاک
 - ۳) دمای بالای هوا و رطوبت بالای خاک
 - ۴) طوبت بالای خاک و دمای پایین هوا
- ۱۷۵ نگونسار گل (سیکلامن ایرانی) پس از تشکیل چند برگ و از محور کدام برگ شروع به گلدهی می‌کند؟
- ۱) ۶ تا ۸ برگ - برگ هشتم
 - ۲) ۶ تا ۸ برگ - برگ ششم
 - ۳) ۱۰ تا ۱۳ برگ - برگ ششم
- ۱۷۶ برای تولید گل با کیفیت و با رنگ ماندگار براکته‌های بنت قنسول (سرخ برگه) بایستی از چه تیماری استفاده نمود و آن را تا چه زمانی ادامه داد؟
- ۱) روز کوتاه - ریزش دانه‌های گردد
 - ۲) روز بلند - ریزش دانه‌های گردد
 - ۳) روز بلند - ریزش دانه‌های گردد
- ۱۷۷ کدام گروه از گونه‌های گیاهی زیر دارای برگ مرکب شانه‌ای هستند؟
- ۱) مورد، افراسیا، ابریشم مصری، زبان گنجشک
 - ۲) پیچ گلیسین، درخت پروانه، پیچ اناری، درخت پر
 - ۳) درخت ابریشم، اقاقیا، لیلکی، پیچ گلیسین
 - ۴) نخود درختی، اقاقیا، انار زینتی، درخت پروانه
- ۱۷۸ اصطلاح **Stenting** مربوط به است.
- ۱) عمل ضدغونه نمونه‌ها در کشت بافت
 - ۲) نمونه مورد استفاده در کشت بافت
 - ۳) انجام پیوند روی قلمه‌های جوان نسترن
- ۱۷۹ کدام عبارت برای گیاه **Begonia Semperflorence** صحیح می‌باشد؟
- ۱) این گیاه ریزومدار بوده و به کمک قطعات برگی (قلمه برگ) تکثیر می‌شود.
 - ۲) این گیاه ریشه‌های افسان داشته و بدون تولید بذر فقط با قلمه برگی تکثیر می‌گردد.
 - ۳) این گیاه دارای ساقه غده‌ای است و در هوای آزاد به عنوان یک گل تابستانه کشت می‌گردد.
 - ۴) گیاهی است با ریشه‌های افسان که به راحتی تولید بذر نموده و با قلمه ساقه تکثیر می‌شود.
- ۱۸۰ بذرگیوی در گیاه سیکلامن چگونه است؟
- ۱) گیاهی است که پایه‌های نر و ماده از هم جدا بوده و گرده‌افشانی بصورت مصنوعی صورت می‌گیرد.
 - ۲) گیاهی است که گل‌های نر و ماده بپوشید یک پایه قرار دارند و بذرهای خودگشتن تولید می‌نماید.
 - ۳) گیاهی است که گل‌های نر عقیم داشته و همواره تولید بذرهای عقیم می‌نماید.
 - ۴) گیاهی است که اصلًا تولید بذر نداشته و به روش‌های رویشی تکثیر می‌گردد.

مشاهده کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

کد رشته امتحانی	نام رشته امتحانی	نوع دفرجه	شماره باستخدامه	گروه امتحانی
1305	مهندسی کشاورزی - علوم باغیابی	F	1	کشاورزی
151	3		31	3
152	4		32	3
153	1		33	2
154	1		34	1
155	3		35	4
156	2		36	1
157	1		37	2
158	4		38	4
159	2		39	4
160	3		40	2
161	4		41	1
162	2		42	3
163	4		43	1
164	4		44	3
165	2		45	2
166	1		46	2
167	3		47	4
168	2		48	1
169	4		49	4
170	3		50	1
171	1		51	1
172	2		52	4
173	1		53	4
174	2		54	2
175	3		55	3
176	1		56	3
177	3		57	3
178	3		58	1
179	4		59	1
180	1		60	4

خروج