

۱۱۱

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان متخصص آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی (کد ۲۱۱۶)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مجموعه دروس شخصی (آغار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی پیشرفته – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)	مواد امتحانی	تعداد سوال	نا شماره	از شماره	تعداد سوال
۱	۸۰	۱	۸۰			

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعابی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:

- ۱- در یک گروه از ورزشکاران که میانگین قد آن‌ها 171 cm و انحراف معیار 34 سانتی‌متر است، ضریب پراکندگی کدام است؟
- (۱) 0.2
(۲) 2
(۳) 20
(۴) 200
- ۲- نمره T برای یک دونده 100 متر با رکورد 12 ثانیه، در صورتی که میانگین رکوردهای مسابقه 11.5 ثانیه و انحراف استاندارد یک باشد، چقدر است؟
- (۱) 45
(۲) 55
(۳) 65
(۴) 100
- ۳- اگر رکورد فردی در دوی سرعت 15 باشد؛ در صورتی که میانگین و واریانس به ترتیب 13 و 14 باشد، نمره T او چقدر است؟
- (۱) 60
(۲) 55
(۳) 45
(۴) 40
- ۴- در کدام روش آماری جهت بررسی ضریب اعتماد (بایایی) آزمون، واریانس نمره‌ها اندازه‌گیری می‌شود؟
- (۱) روش «باز آزمایی»
(۲) روش «آلفای کرونباخ»
(۳) روش «دو نیمه کردن آزمون»
(۴) روش «استفاده از آزمون های همتا»
- ۵- هنگامی که افراد یک گروه در دو یا چند موقعیت آزمون می‌شوند؛ روش آماری مناسب کدام است؟
- (۱) آزمون t همبسته
(۲) تحلیل واریانس دوراهه
(۳) تحلیل واریانس یکراهه
(۴) احتمال رد فرضیه صفر در کدام آزمون کمتر است؟
- ۶-
- (۱) در آزمون دو سویه (دو دامنه) و با سطح معنی‌داری 0.01
(۲) در آزمون دو سویه (دو دامنه) با سطح معنی‌داری 0.05
(۳) در آزمون تک سویه (تک دامنه) با سطح معنی‌داری 0.01
(۴) در آزمون تک سویه (تک دامنه) با سطح معنی‌داری 0.05
- ۷- تصور کنید پس از یک دور تمرینی به دو روش فیزیکی و مشاهده‌ای، رکوردهای زیر در آزمون پاس پنجه به دست آمده است. کدام روش تمرینی ضریب تغییر کمتری داشته است؟

n	\bar{x}	SD	گروه
۲۵	۵۳/۱	۶/۲	مشاهده
۲۵	۵۳/۷	۹/۴	فیزیکی

- (۱) فیزیکی
(۲) مشاهده
(۳) مشاهده و فیزیکی
(۴) احتیاج به اطلاعات دیگر می‌باشد.

- ۸- میانگین توزیعی ۲۵ و انحراف معیار آن ۲ است. چنانچه تمام نمرات این توزیع در عدد ۳ ضرب شوند، واریانس توزیع جدید چه عددی خواهد بود؟
- | | |
|--------|-------|
| ۶ (۲) | ۴ (۱) |
| ۳۶ (۴) | ۹ (۳) |
- ۹- اگر در ارزیابی معلمان جدید تربیت‌بدنی، به‌طور همزمان بخواهیم به یک گروه از ورزشکارانی که در حال تمرین پنجه والبیال هستند نمره بدنه‌ند و نمره آن‌ها را با نمره یک مربی با تجربه والبیال مقایسه کنیم، کدام ویژگی آزمون را بررسی نموده‌ایم؟
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۲) ضریب تمیز (reliability) | ۱) اعتبار پایابی (validity) |
| ۴) عینیت (validity) | |
- ۱۰- در یک امتحان سنجش و اندازه‌گیری در صورتی که ۱۵ نفر از ۳۰ دانشجوی زرنگ کلاس به سؤال (۴) پاسخ صحیح داده باشند و ۲۰ نفر از ۳۰ نفر دانشجوی ضعیف هم به همان سؤال پاسخ صحیح داده باشند، کدام مورد در رابطه با وضعیت سؤال (۴) درست است؟
- | |
|--|
| ۱) دارای ضریب دشواری خوب و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد. |
| ۲) دارای ضریب دشواری ضعیف و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد. |
| ۳) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز خوب می‌باشد. |
| ۴) دارای ضریب دشواری و ضریب تمیز نامناسب می‌باشد. |
- ۱۱- اگر رکورد مسابقات دو و میدانی المپیک ریو دارای میانگین ۹,۹۸ باشد، در صورتی که یکی از دوندگان جامائیکایی دارای رکورد ۱۵,۱۰ باشد، رتبه درصدی این دونده در بین سایر دوندگان چقدر است؟
- | |
|------------------------|
| ۱) بالاتر از ۵۰ درصد |
| ۲) پایین‌تر از ۵۰ درصد |
- ۱۲- اگر ضریب همبستگی هوش و تعادل ۹,۰ + و هوش و هماهنگی ۸,۰ + باشد، کدام تفسیر تحلیلی درست‌تر است؟
- | |
|--|
| ۱) همبستگی هوش و تعادل ۱/۰ بزرگ‌تر از هوش و هماهنگی است. |
| ۲) همبستگی هوش و تعادل قوی‌تر از همبستگی هوش و هماهنگی است. |
| ۳) همبستگی هوش و تعادل در مقایسه با هوش و هماهنگی معنادارتر است. |
| ۴) واریانس همبستگی هوش و تعادل ۱۷ درصد بیشتر از هوش و هماهنگی است. |
- ۱۳- کدام روش آماری برای برآورده رابطه بین دو متغیر اسمی، مناسب است؟
- | |
|--------------------|
| ۱) ویلکاکسون |
| ۲) مجذورکای پیرسون |
| ۳) کروسکال والیس |
| ۴) همبستگی اسپیرمن |
- ۱۴- اگر نتایج مقایسه تفاوت رتبه‌های چهار گروه نمونه آماری معنادار باشد، برای تعیین منشا تفاوت درون گروه‌ها، کدام آمون تعقیبی مناسب‌تر است؟
- | |
|------------------|
| ۱) توکی |
| ۲) مستقل |
| ۳) ویلکاکسون |
| ۴) یوی‌مان ویتنی |

- ۱۵- کدام مورد، بهترین ضریب دشواری و ضریب تمیز یک سؤال را نشان می‌دهد؟
- (۱) ضریب دشواری $0/5^{\circ}$ و ضریب تمیز 1°
 (۲) ضریب دشواری 1° و ضریب تمیز $5/0^{\circ}$
- ۱۶- هنگامی که برای تعیین روایی یک آزمون جدید با استفاده از روش همبستگی پیرسون، نتایج بدست آمده از یک گروه با نتایج همان گروه در یک آزمون استاندارد را مقایسه می‌کنیم، کدام نوع روایی را سنجیده‌ایم؟
- (۱) روایی پیش‌بین
 (۲) روایی صوری
 (۳) روایی همزمان
- ۱۷- کدام یک از روش‌های تعیین پایایی آزمون، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری و پرسشنامه به کار می‌رود؟
- (۱) آلفای کرونباخ
 (۲) بازآزمایی
 (۳) فرم‌های همارز
- ۱۸- اگر در درس حرکت‌شناسی $14 = \bar{x}$ و اختلاف بین نمرات $Z(-1,+1)$ برابر 3 باشد، نموده خام فردی که رتبه درصدی وی حدود 84 می‌باشد، چقدر است؟
- (۱) 17 (۲)
 (۳) $15/5$ (۴)
- ۱۹- اگر مجموع رکوردهای قدرت $\bar{G} = 42$ دست 50 نفر برابر 1050 باشد و واریانس نمره‌ها برابر 4 باشد، فردی که نمره خام گرفته است از حدود چند درصد افراد کلاس نمره بهتری گرفته است؟
- (۱) 7.98 (۲)
 (۳) 7.68 (۴)
- ۲۰- اگر نمره T فرد در آزمون قدرت پایین‌تره 80 باشد و میانگین نمرات و انحراف استاندارد به ترتیب 70 و 10 باشد، نمره خام فرد چقدر است؟
- (۱) 150 (۲)
 (۳) 200 (۴)
- (۱) 85
 (۳) 100

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته:

- ۲۱- کدام تارها در شرایط بی‌وزنی، دچار آتروفی بیشتری می‌شوند؟
- (۱) نوع I (۴) نوع IIa (۲) نوع IIb (۳) نوع Ix
- ۲۲- شناگری که در اجرای شنای بروانه کاملاً ماهر است ولی نمی‌تواند آن را طبق توالی صحیح فراخوان و اجرا کند، در چه ناجیهای از قشر مغزی مشکل دارد؟
- (۱) حرکتی مکمل
 (۳) حسی ثانویه
- ۲۳- کدام عبارت درباره نقش اعصاب سمباتیک در تنظیم کار قلب درست است؟
- (۱) افزایش اولیه ضربان قلب هنگام فعالیت ورزشی
 (۲) افزایش ضربان قلب و عدم تأثیر در نیروی انقباضی عضله قلب
 (۳) تحریک گره‌های SA و AV در فعالیت‌های ورزشی شدید
 (۴) ترشح ایپی‌نفرین و ایجاد هایپرپلازی‌سیون در عضله قلبی

- ۲۴- انقباض عضلانی به دو روش جابه‌جایی GLUT^۴ به غشای پلاسمایی را زیاد می‌کند، در این میان فعالیت هنگام کمبود انرژی با کدام عامل ارتباط می‌یابد؟
- (۱) کاهش اگزوسیتوز GLUT^۴ و در نتیجه کاهش و افزایش دوره‌ای هزینه انرژی سلول
 - (۲) افزایش اگزوسیتوز GLUT^۴ و در نتیجه کاهش هزینه انرژی سلول
 - (۳) افزایش اندوسیتوز GLUT^۴ و به دنبال آن کاهش هزینه انرژی سلول
 - (۴) کاهش اندوسیتوز GLUT^۴ و به دنبال آن کاهش هزینه انرژی سلول
- ۲۵- برای کاستن از خستگی عصبی مرکزی، کدام روش مؤثر است؟
- (۱) افزایش مصرف BCAA
 - (۲) افزایش ترشح و گیرنده‌های سروتونین
 - (۳) افزایش برداشت سروتونین
- ۲۶- در اثر سازگاری با تمرين در محیط گرم، کدام عامل سریع تر رخ می‌دهد؟
- (۱) تواتر قلبی
 - (۲) دمای پوستی
 - (۳) دمای مرکزی بدن
 - (۴) میزان تعربق
- ۲۷- با شروع فعالیت ورزشی، LV-EDV افزایش می‌یابد، نکته صحیح درباره این اتفاق کدام است؟
- (۱) افزایش حجم ضربه‌ای به عنوان پیامد قطعی
 - (۲) کاهش مجاورت جایگاه‌های پیوندی آکتین - میوزین
 - (۳) افزایش آزاد شدن Ca^{۲+} از SR در طول کوتاه سارکومر
 - (۴) حساسیت کمتر از حد لازم Ca^{۲+} در طول سارکومر
- ۲۸- هنگام فعالیت ورزشی خیلی شدید، کاهش کدام عامل باعث خنثی شدن عدم تعادل انتشاری در مویرگ ریوی می‌شود؟
- (۱) شب انتشار حبابچه‌ای
 - (۲) مسافت انتشاری
 - (۳) حجم خون مویرگ ریوی
 - (۴) مساحت سطح حبابچه‌ای مویرگی
- ۲۹- عبارت صحیح درباره گیرنده‌های سوخت‌وسازی عضله کدام است؟
- (۱) هنگام فعالیت ورزشی زیربیشینه در افراد سالم، سازوکار اصلی افزایش فشار شریانی، کاهش برون‌ده قلبی است.
 - (۲) بارورفلکس‌های شریانی نسبت به کم خونی مغز حساس‌اند و می‌توانند فشار شریانی را افزایش دهند.
 - (۳) بارورفلکس‌های سوخت‌وسازی عضله می‌توانند فشار سرخرگی را تا حد زیادی کاهش دهند.
 - (۴) افزایش انقباض پذیری بطی، نشانه افزایش پرشدگی بطی و کاهش پیش بار است.
- ۳۰- هنگام فعالیت ورزشی بلندمدت در سرما در مقایسه با فعالیت ورزشی بلندمدت در شرایط گرم‌تر، میزان اسیدهای چرب آزاد چه تغییری می‌کند؟
- (۱) بیش از دو برابر افزایش می‌یابد.
 - (۲) تدریجی افزایش می‌یابد.
 - (۳) تا حدودی افزایش می‌یابد.
 - (۴) تغییر چندانی نمی‌کند.
- ۳۱- از نقطه نظر ظرفیت هوایی و کارایی دویدن، تعیین کننده بهتر عملکرد استقاماتی، کدام است؟
- $$\lim_{t \rightarrow \infty} v_{VO_{2\max}} \quad (۱)$$
- $$v_{VO_{2\max}} \quad (۲)$$
- $$VO_{2\max} \quad (۳)$$
- ۳۲- محتمل‌ترین عامل درد موقتی ناشی از فعالیت ورزشی سنگین در ناحیه شکم کدام است؟
- (۱) ایسکمی عضله دیافراگمی
 - (۲) تحریک رباط‌های دیافراگمی احتشایی
 - (۳) نفخ معده و تغییر فشار شکمی
 - (۴) هایپوکسی عضله دیافراگمی

- ۳۳- در سلسله مراتب سازگاری‌های ناشی از تمرین فعالیت ورزشی در پیوستگاه عصبی عضلاتی پستانداران، کدام سازگاری مؤخر بر سایرین است؟
- (۱) افزایش nAChR_S پس‌سیناپسی
 (۲) تغییر فعالیت AChE
 (۳) تغییر فعالیت ChAT
 (۴) تغییر مورفولوژی NMJ
- ۳۴- تغییرات فشار درون سینه‌ای هنگام عمل دم و بازدم به ترتیب باعث چه تغییری می‌شود؟
- (۱) افزایش و کاهش حجم ضربه‌ای
 (۲) کاهش و افزایش پیش بار بطئی
 (۳) افزایش و کاهش شب فشار ترنسمورال در عرض دیواره قلبی
 (۴) کاهش و افزایش شب فشار ترنسمورال در عرض دیواره قلبی
- ۳۵- دلیل هیپوکسی هنگام فعالیت ورزشی در سطح دریا کدام است؟
- (۱) کاهش زمان انتقال ریوی
 (۲) کاهش غلظت اکسیژن سرخرگی
 (۳) تعادل بین فشار و غلظت اکسیژن سرخرگی
 (۴) تعادل بین بروند و جریان خون مویرگی
- ۳۶- هنگام فعالیت ورزشی در سطح VO_{max} ، کدام تفاوت پاسخ‌های تهویه‌ای دو فرد تمرین کرده و تمرین نکرده تقریباً یکسان می‌باشد؟
- (۱) حجم پایان بازدیدی ریه
 (۲) حجم خون مویرگی ریه
 (۳) نسبت حجم فضای مرده به حجم جاری
 (۴) مقاومت عروق ریوی
- ۳۷- کدام عبارت، درست است؟
- (۱) غلظت میوزین در عضله اسکلتی تقریباً $\frac{1}{3}$ غلظت آن در عضلات صاف است.
 (۲) حداکثر تنفس بهازای هر واحد سطح مقطع در عضلات صاف و اسکلتی تفاوتی ندارد.
 (۳) حداکثر تنفس بهازای هر واحد سطح مقطع در عضلات اسکلتی بیشتر از عضلات صاف است.
 (۴) گسترش حداکثر تنفس بهازای هر واحد سطح مقطع در عضلات صاف بیشتر از عضلات اسکلتی است.
- ۳۸- هنگام فعالیت ورزشی زیربیشینه، میزان جریان خون کلیه و فیلتراسیون گلومرولی دستخوش چه تغییری می‌شوند؟
- (۱) همسو هر دو افزایش می‌یابند.
 (۲) همسو هر دو کاهش می‌یابند.
 (۳) تغییر محسوسی در هیچ کدام ایجاد نمی‌شود.
 (۴) به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابند.
- ۳۹- کدام عامل، خستگی پذیری متفاوت کودکان در مقایسه با بزرگسالان را توجیه می‌کند؟
- (۱) آسیب ناشی از فعالیت ورزشی (EIMD) در کودکان بیشتر است و درنتیجه خستگی محیطی سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
 (۲) به واسطه فرایندهای گلیکولیز، تجمع لاکتان در کودکان بیشتر است.
 (۳) خستگی مرکزی در کودکان سریع‌تر از بزرگسالان اتفاق می‌افتد.
 (۴) کودکان با بهکارگیری تارهای نوع II زودتر دچار خستگی می‌شوند.
- ۴۰- اگر فعالیت ورزشی بلندمدت روزانه انجام شود، باید از رژیم غذایی پرکربوهیدارت تا چند ساعت پس از فعالیت ورزشی استفاده کرد؟
- (۱) ۴ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲
- ۴۱- فسفوریلاسیون کدام بروتئین در شبکه آندوپلاسمی میوکاردی، انتقال فعال کلسیم را کنترل می‌کند؟
- (۱) پیریدین
 (۲) فسفولامبان
 (۳) کالmodولین
 (۴) رایونودین

- ۴۲- در مسیر هیپرتروفی عضله، کدام پروتئین پیام‌رسان درون سلولی مهار می‌شود؟
- (۱) AKt (۲) mTOR (۳) کلسی نورین (۴) گلیکوزن سنتتاز کیناز
- ۴۳- نیروی انقباض قلب مناسب با افزایش بار کار کاهش می‌باید، بهترین عامل توجیه کننده این تغییر کدام است؟
- (۱) اندازه پایان دیاستولی بطن چپ خیلی سریع کاهش می‌باید.
 (۲) با افزایش بار کار، در هر ضربه تنها بخشی از قلب تخلیه می‌شود.
 (۳) کسر کوتاه شدگی بطن چپ هنگام فعالیت ورزشی فزاینده افزایش می‌باید.
 (۴) در این تغییر، بعد پایان سیستولی به تدریج و در زمانی طولانی کاهش می‌باید.
- ۴۴- کدام شاخص، حساس‌ترین عامل تغییر در تهویه و متابولیسم به شمار می‌رود؟
- (۱) آستانه تهویه‌ای (۲) آستانه لاكتات (۳) نقطه شکست لاكتات (۴) نسبت تهویه به اکسیژن مصرفی
- ۴۵- از میان پروتئین‌های کوستاموی درگیر در تعامل سارکومر و ماتریکس برون سلولی، کدام یک وظیفه ثبات اسکلت سلولی و سارلما را برعهده دارد؟
- (۱) تالین (۲) وینکولین (۳) دیستروپروین (۴) دیستروفین
- ۴۶- با کدام طول سارکومر، تانسیون عضله قلبی به سرعت گسترش می‌باید؟
- (۱) ۱/۸۵ تا ۲/۴ میکرومتر (۲) ۱/۸۵ تا ۲/۴ میکرومتر (۳) ۲/۲ تا ۲/۴ میکرومتر
- ۴۷- هنگام انقباض و شل شدن عضله، تغییرات طول تاندون عضلانی را کدام گیرنده حسی بهتر به مغز مخابره می‌کند؟
- (۱) اندام وتری گلزاری (۲) پایانه‌های اولیه Ib (۳) پایانه‌های اولیه II (۴) پایانه‌های ثانویه
- ۴۸- کدام عامل در دوره کاهش تدریجی فشار تمرين رخ می‌دهد؟
- (۱) قدرت عضلانی تا حد زیادی افزایش می‌باید.
 (۲) قدرت عضلانی و استقامت تغییر چندانی نمی‌کند.
 (۳) بر حجم و شدت تمرينات اختصاصی افزوده می‌شود.
 (۴) تمرين بیشتری برای حفظ آمادگی اختصاصی لازم است.
- ۴۹- در کنترل حرکتی و تقویت تکانه‌های حرکتی در حال شروع در قشر مغز، کدام جایگاه درگیر می‌شود؟
- (۱) عقده‌های قاعده‌ای (۲) ناحیه پیش حرکتی (۳) تشکیلات مشبك (۴) سیستم لیمبیک
- ۵۰- مکمل‌سازی کدام عامل باعث تحریک سلول‌های ماهواره‌ای عضله و عوامل تنظیم میوژنیک می‌شود؟
- (۱) کوازنیم Q (۲) BCAA (۳) کراتین (۴) پروتئین وی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی:

- ۵۱- کدام مورد درست است؟
- (۱) کاتاکولامین‌ها با فعال کردن گیرنده‌های آلفا - آدرنرژیک باعث افزایش غلظت گلیسروول و اسید چرب می‌شوند.
 (۲) آدنیلات سیکلاز با مهار لیپاز حساس به هورمون لیپولیز را متوقف می‌کند.
 (۳) پروستاگلاندین‌ها از راه تعامل با پروتئین G_i لیپولیز را فعال می‌کند.
 (۴) لپتین از راه مهار فسفودی‌استراز لیپولیز را تسريع می‌کند.

- ۵۲- با افزایش مدت فعالیت ورزشی و افزایش اسیدهای چرب در دسترس، افزایش AMPK ناشی از فعالیت ورزشی چه کاری انجام می‌دهد؟
- (۱) فعالیت CPT1 را زیاد می‌کند.
 - (۲) مقدار مالونیل - کوا را زیاد می‌کند.
 - (۳) اکسایش کربوهیدرات را زیاد می‌کند.
 - (۴) اکسایش اسیدهای چرب را کاهش می‌دهد.
- ۵۳- در نمونه‌برداری سوزنی عضله، با تقسیم غلظت متابولیت‌ها در وزن خشک عضله بر چه عددی، غلظت تقریبی بر حسب مقادیر تر عضله به دست می‌آید؟
- | | |
|----------|----------|
| (۱) ۴/۱۱ | (۲) ۲/۵۳ |
| (۳) ۸/۲ | (۴) ۶/۱۵ |
- ۵۴- افزایش آمونیاک (NH_4^+) عضله و خون، نشانه غیرمستقیم کدام مورد است؟
- (۱) اکسیداسیون اسیدهای آمینه هنگام فعالیت ورزشی بلندمدت
 - (۲) اکسیداسیون لیپیدها هنگام فعالیت ورزشی
 - (۳) کتوزیس هنگام فعالیت ورزشی
 - (۴) افزایش گلوکونورونز در کبد
- ۵۵- هنگام فعالیت‌های ورزشی، محتمل‌ترین عامل مؤثر بر پتانسیل ردوکس میتوکندریایی کدام است؟
- (۱) دستریسی به سوبسترای سوخت‌وسازی
 - (۲) فعال‌شدن پیرووات دهیدروژناز
 - (۳) کسر اکسیژن انباشتی در خون
 - (۴) میزان NAD^+ موجود در عضله
- ۵۶- هنگام فعالیت ورزشی هوازی، زمانی که در مسیر گلیکولیز پیروات به استیل کو A تبدیل می‌شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
- | | |
|---|---|
| (۱) آزادسازی CO_2 و تولید H_2O | (۲) تولید توانان H_2O و CO_2 |
| (۳) تولید H_2O و دوباره‌سازی NAD^+ | (۴) دوباره‌سازی NAD^+ و رهایش CO_2 |
- ۵۷- در کدام فعالیت ورزشی، میزان اسید اوریک خون خیلی زیاد افزایش می‌یابد؟
- (۱) زیربیشینه
 - (۲) مقاومتی فراینده
 - (۳) فوق بیشینه
 - (۴) گلیکولیزی
- ۵۸- کدم آنزیم در دوباره‌سازی NAD^+ سیتوزولی در فسفردار شدن در سطح سوبسترا نقش دارد؟
- (۱) آلفا - کتوگلوتارات دهیدروژناز
 - (۲) فسفوفروکتوکیناز
 - (۳) سیترات دهیدروژناز
 - (۴) لاکاتات دهیدروژناز
- ۵۹- مؤثر ترین عامل محرك و مهم‌ترین فایده چرخه پورین نوکلئوتید به ترتیب کدام است؟
- (۱) افزایش ADP، تشكیل فومارات
 - (۲) افزایش AMP، حفظ شارژ انرژی
 - (۳) افزایش ATP، تحریک فسفوکراتین کیناز
 - (۴) کاهش PH، فعال‌شدن گلیکوژن فسفوریلاز
- ۶۰- هنگام فعالیت ورزشی، تغییر سوخت‌وسازی توازن با افزایش شدت، کدام است؟
- (۱) عدم تغییر در ترکیبات فسفات پر انرژی عضلات مخلوط
 - (۲) عدم تغییر بارز در ترکیبات فسفات پر انرژی عضله اسکلتی
 - (۳) مشاهده تغییرات بارز در غلظت آدنین نوکلئوتید قلبی
 - (۴) مشاهده نشدن تغییرات بارز در غلظت آدنین نوکلئوتید قلبی

- ۶۱- افزایش سیترات ناشی از لیپولیز در یک فعالیت ورزشی هوازی در سلوول، فعالیت کدام مسیر متابولیکی را کاهش می‌دهد؟
- (۱) گلیکوژن
 - (۲) گلیکولیز
 - (۳) گلوکونوژن
- ۶۲- هنگام بازیافت پس از یک فعالیت ورزشی، انسولین با چه سازوکاری لیپولیز را مهار می‌کند؟
- (۱) مهار کارتیتین غشاء پلاسمایی
 - (۲) فعال کردن پروتئین کیناز A
 - (۳) فعال کردن فسفودی استراز A
- ۶۳- کدام مورد درباره فعالیت ورزشی و نوسازی پروتئین درست است؟
- (۱) اندازه نوسازی پروتئین با نوع، شدت و مدت فعالیت انقباضی ارتباط ندارد.
 - (۲) نوسازی پروتئین هنگام فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت جهت معکوس را طی می‌کند.
 - (۳) فعالیت انقباضی با شدت و مدت کافی، سنتز پروتئین عضله اسکلتی را تغییر نمی‌دهد.
 - (۴) هنگام فعالیت ورزشی، مقادیر نوسازی خالص پروتئین عضله در جهت‌های مخالف حرکت می‌کند.
- ۶۴- کدام نظریه به افزایش حجم میتوکندری ناشی از سازگاری به فعالیت ورزشی و درنتیجه اتکا به چربی اشاره دارد؟
- (۱) رندل
 - (۲) میشل
 - (۳) هانسن
- ۶۵- کدام مورد درباره زنجیره انتقال الکترون درست است؟
- (۱) در تمام سلوول‌های جانداران، زنجیره انتقال الکترون برای تولید انرژی وجود دارد.
 - (۲) انرژی آزاد، بر حسب تعداد اکی والان‌های انتقال‌یافته محاسبه می‌شود.
 - (۳) غلظت ADP موجود در زنجیره، تأثیری در واکنش ندارد.
 - (۴) در طول زنجیره، سیتوکروم‌ها یک الکترون منتقل می‌کنند.
- ۶۶- پس از تقریباً ۴۵ تا ۴۰ دقیقه فعالیت ورزشی پایدار، گلوکونوژن فرایند مهم تولید گلوکز خون می‌شود. نسبت‌های هورمونی مناسب در این حالت کدام است؟
- (۱) غلظت انسولین کم و مقادیر گلوکاگن زیاد
 - (۲) غلظت انسولین و مقادیر گلوکاگن زیاد
 - (۳) غلظت انسولین و مقادیر گلوکاگن کم
 - (۴) غلظت انسولین زیاد و غلظت گلوکاگن کم
- ۶۷- کدام دستگاه، عامل اصلی تجزیه سریع توده پروتئین عضله (پروتئین‌های تارچه‌ای، آکتین و میوزین) به شمار می‌رود؟
- (۱) اتوفازی
 - (۲) بروتولیزی لیزوزومی
 - (۳) یوبی کیتین - پروتئوزوم
 - (۴) کاسپار - نوتريوم
- ۶۸- هنگام فعالیت‌های ورزشی، فعال‌کننده اصلی پیررووات دهیدروژناز کدام است؟
- (۱) کلیسیم و پیررووات
 - (۲) گلوکز - ۶-فسفات
 - (۳) سیترات و مالات
- ۶۹- کدام مورد درست است؟
- (۱) فعالیت بدنی از راه فعالیت تیروزین کیناز در انتقال و برداشت گلوکز عضله نقش دارد.
 - (۲) افزایش کلیسیم سارکوپلاسمی و هیبوکسی سبب افزایش انتقال گلوکز به عضله می‌شوند.
 - (۳) با افزایش اکسیداسیون اسید چرب و افزایش سیترات، برداشت گلوکز توسط سلوول افزایش می‌یابد.
 - (۴) اپی‌نفرین از راه تحریک گیرنده‌های بتا آدرنرژیک موجب افزایش فعالیت انتقال‌دهنده‌های گلوکز می‌شود.

- ۷۰- کدام مورد مربوط به سازگاری با تمرین ورزشی است؟
- (۱) افزایش گیرنده‌های HT_{la}
 - (۲) افزایش رهایش HT با حفظ قندخون
 - (۳) کاهش حساسیت به HT - هیدروکسی تریپتامین
 - (۴) افزایش چگالی گیرنده منجر به کاهش حساسیت به HT
- ۷۱- عامل فعال کننده آنزیم فسفوفروکتوکیناز که هنگام فعالیت‌های ورزشی بی‌هوایی افزایش می‌یابد، کدام است؟
- (۱) فسفات غیرآلی
 - (۲) سیترات
 - (۳) فسفوکراتین
- ۷۲- ارزش‌های بازآفرینی حداکثر EPOC، دامنه‌ای بین ۱۵ تا ۲۱ لیتر اکسیژن می‌باشد، معادل هزینه اضافی کالریک آن چند کیلوکالری است؟
- (۱) ۶۹ تا ۳۳
 - (۲) ۱۰۰ تا ۷۰
 - (۳) ۱۱۸ تا ۱۵۳
 - (۴) ۱۸۰ تا ۲۲۰
- ۷۳- کدام فرایند باعث افزایش سرعت گلیکوزنولیز کبدی هنگام فعالیت بدنی می‌شود؟
- (۱) افزایش AMP سیتوزولی
 - (۲) افزایش کلسیم سیتوزولی
 - (۳) افزایش میزان لاکتات
 - (۴) فعال شدن پروتئین کیناز B
- ۷۴- کدام عامل نقش اصلی را در تنظیم تأمین گلوکز عضله اسکلتی هنگام فعالیت ورزشی بر عهده دارد؟
- (۱) افزایش فراهمی مویرگی
 - (۲) پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن
 - (۳) عوامل موضعی درون عضلانی
 - (۴) نیتریک اکساید
- ۷۵- کدام عبارت درباره کالپاین‌ها و فعالیت ورزشی درست است؟
- (۱) کالپاینی که بر اثر Ca^{2+} فعال می‌شود تأثیری بر افزایش تجزیه پروتئین‌ها هنگام فعالیت ورزشی ندارد.
 - (۲) درد عضلانی ناشی از فشار فعالیت ورزشی شدید، باعث کاهش فعالیت کالپاین‌ها می‌شود.
 - (۳) کالپاین‌ها بر پروتئین‌های انقباضی موجود در عضله عمل می‌کنند و فعال می‌شوند.
 - (۴) کالپاین‌ها بر اثر افزایش Ca^{2+} ناشی از فعالیت ورزشی قعال می‌شوند.
- ۷۶- اگر فرض کنیم ورزشکاری در یک دوی ۴۰۰ متر فقط ۲ اسید پالمیتیک وارد فرایند بتا اکسایش کند، معادل ATP تولیدی تام صرفاً از واکنش‌های بتا-اکسایش این ۲ اسید، چند تا است؟
- (۱) ۱۹۲
 - (۲) ۹۶
 - (۳) ۷۰
 - (۴) ۳۵
- ۷۷- اسیدآمینه‌هایی که پس از جذب پروتئین رژیم غذایی، مستقیم توسط عضله اسکلتی برداشت و وارد متabolism می‌شوند، کدام است؟
- (۱) لوسین و والین
 - (۲) لیزین و گلیسین
 - (۳) گلوتامین و والین
 - (۴) آلانین و ایزولوسین

- ۷۸- پس از فعالیت ورزشی و هنگام بازسازی گلیکوژن، در چه مرحله‌ای آدنین نوکلئوتید UTP تجزیه می‌شود؟
- (۱) تبدیل UDP گلوکز به گلیکوژن
 - (۲) تبدیل گلوکز -۶ -فسفات به گلوکز -۱ -فسفات
 - (۳) تبدیل گلوکز -۶ -فسفات به UDP گلوکز
 - (۴) تبدیل گلوکز -۱ -فسفات به UDP گلوکز
- ۷۹- کدام واکنش بیشتر در تار عضلانی نوع I رخ می‌دهد؟
- (۱) دفسفوریلاسیون AMP به آدنوزین
 - (۲) تبدیل آدنوزین به هیپوگرانتین
 - (۳) تبدیل هیپوگرانتین به گرانتین
 - (۴) آمیناسیون IMP به AMP
- ۸۰- محرک فعالیت ورزشی، **AMPK** سیتوپلاسمی را زیاد می‌کند، در ادامه چه اتفاقی می‌افتد؟
- (۱) مهار آنزیم ACC - کاهش استیل کو A - مهار دوره‌ای CPT۲
 - (۲) مهار آنزیم PFK - افزایش استیل کو A - سنتز زیاد اسید چرب
 - (۳) تحریک آنزیم ACC - کاهش مالونیل کو A - مهار CPT۱
 - (۴) مهار آنزیم ACC - کاهش مالونیل کو A - مهار CPT۱

کلید اولیه دکترای سال 1396

کلید اولیه دکترای سال 1396

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکترای سال 1396 می‌رساند، در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 16/12/95 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی، نسبت به تکمیل فرم «اعتراض به کلید سوالات آزمون» اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی و فرم مذکور دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طرق دیگر و پس از تاریخ اعلام شده، به هیچ عنوان رسیدگی نخواهد شد

گروه امتحانی	شماره پاسخنامه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
علوم انسانی	1	F	تریت بدینی - فیزیولوژی ورزشی

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	3	31	4	61	2
2	1	32	2	62	4
3	4	33	1	63	4
4	2	34	3	64	4
5	4	35	2	65	4
6	1	36	3	66	1
7	2	37	2	67	3
8	4	38	2	68	1
9	3	39	3	69	2
10	1	40	2	70	3
11	2	41	2	71	1
12	4	42	4	72	2
13	2	43	3	73	2

14	3	44	4	74	3
15	1	45	4	75	4
16	3	46	1	76	3
17	1	47	2	77	1
18	4	48	1	78	4
19	2	49	1	79	1
20	3	50	4	80	4
21	4	51	4		
22	4	52	1		
23	3	53	2		
24	4	54	1		
25	1	55	2		
26	1	56	1		
27	1	57	3		
28	2	58	3		
29	2	59	2		
30	3	60	4		

خروج