

کد کنترل

463

F

463F

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی (کد ۲۲۲۳)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست‌شناسی سلوی و مولکولی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی – فیزیولوژی غشاء سلوی	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی جانوری - بیوشیمی - زیست‌شناسی سلوالی و مولکولی - فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی - فیزیولوژی غشاء سلوالی):

-۱ فشار نبض در ورزشکاران حرفه‌ای، در حال استراحت نسبت به افراد عادی چگونه است و علت چیست؟

(۱) بزرگ‌تر است - افزایش تعداد ضربان قلب

(۲) کمتر است - کاهش تعداد ضربان قلب

(۳) بزرگ‌تر است - طولانی‌تر بودن زمان پرشدن بطن

-۲ کدامیک، محل اصلی هضم لیپیدی دستگاه گوارش است، کدام سلول هورمون محرک هضم لیپیدی را ترشح می‌کند و در پاسخ به کدام عامل؟

(۱) معده - سلول‌های «G» دیواره فوندوس - اسید معده

(۲) روده باریک - سلول‌های «S» دیواره روده باریک - اسید معده

(۳) روده - سلول‌های «G» دیواره روده - اسید چرب آزاد

(۴) معده - سلول‌های «P» دیواره فوندوس - اسید چرب آزاد

-۳ کدام گزینه در مورد ترشح بزاق درست است؟

(۱) ترشح اولیه بزاق با محیط داخلی ایزوتونیک است.

(۲) ترشح ثانویه بزاق با محیط داخلی ایزوتونیک است.

(۳) ترشح اولیه بزاق نسبت به محیط داخلی هیپوتونیک است.

(۴) ترشح ثانویه بزاق نسبت به محیط داخلی هیپرتونیک است.

-۴ کدام ترکیب، مهارکننده انقباضات معده است؟

(۱) هیستامین (۲) موتیلین (۳) سکرتین (۴) گاسترین

-۵ عدم بازجذب یون‌های سدیم در توبول‌های کلیوی تحت تأثیر کدام هورمون بوده و منجر به چه پدیده‌ای می‌شود؟

(۱) آنزیوتانسین - دیورز و ناتریورمی

(۲) رنین - الیگوری

(۳) آلدوسترون - الیگوری و ناتریورز

-۶ در مرحله اوولاسیون سیکل تخدمانی کدام گزینه درست است؟

(۱) LH به پیک می‌رسد.

(۲) FSH به پیک می‌رسد.

(۳) پروژسترون به پیک می‌رسد.

-۷ کدام گزینه از ویژگی‌های فیزیولوژیک بافت اپیتلیوم است؟

(۱) تراکم زیاد میتوکندری

(۲) محدود بودن تنوع سلولی

(۳) اتصالات بین سلولی منفذدار

(۴) توزیع متقارن پروتئین‌های غشاء

- ۸- چه عاملی در ارتفاعات باعث قلیایی شدن مایعات بدن می‌شود؟
- (۱) دفع یون بی‌کربنات توسط کلیه‌ها
 - (۲) فعال شدن گیرنده‌های شیمیایی مرکزی
 - (۳) فعال شدن گیرنده‌های شیمیایی محیطی
 - (۴) افزایش دی‌فسفوگلیسیرات در گلبول‌های قرمز
- ۹- کدام گزینه جزء اعمال متابولیک کبد است؟
- (۱) گلوکونوژنز
 - (۲) تشکیل آمونیاک
 - (۳) تبدیل گلوکز به فروکتوز
 - (۴) آمیناسیون اسیدهای آمینه
- ۱۰- مکانیسم اثر اعصاب سمپاتیک بر قلب کدام است؟
- (۱) تحریک گیرنده‌های موسکارینی و کاهش تحریک پذیری
 - (۲) رهاسازی نورآدرنالین و افزایش نفوذپذیری به کلر
 - (۳) اثر بر گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک و افزایش نفوذپذیری به کلر
 - (۴) تحریک گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و افزایش نفوذپذیری به سدیم و کلسیم
- ۱۱- در کلیه‌ها اثر اندولین، آنژیوتانسین ۲ و NO به ترتیب کدام است؟
- (۱) افزایش فشار خون - کاهش جریان خون - افزایش مقاومت رگ‌ها
 - (۲) کاهش جریان خون - کاهش جریان خون - افزایش جریان خون
 - (۳) افزایش جریان خون - کاهش مقاومت رگ‌ها - افزایش مقاومت رگ‌ها
 - (۴) کاهش مقاومت رگ‌ها - افزایش ترشح ادرار - کاهش جریان خون
- ۱۲- دریچه‌های دهلیزی بطنی (A-V) در چه زمانی از دوره قلبی به ترتیب باز و بسته می‌شوند؟
- (۱) شروع انقباض ایزومتریک - پایان مرحله تخلیه
 - (۲) شروع سیستول دهلیزها - پایان دیاستول دهلیزها
 - (۳) پایان شل شدن ایزومتریک - شروع انقباض ایزومتریک
 - (۴) شروع انقباض ایزوولمیک - شروع شل شدن ایزوولمیک
- ۱۳- علت فاز سوم منحنی پتانسیل عمل عضله قلب (ریپلاریزاسیون سریع) کدام است؟
- (۱) بازشدن کانال‌های کلسیمی آهسته
 - (۲) بسته شدن کانال‌های سدیم و پتانسیم
 - (۳) بسته شدن کانال‌های پتانسیم و بازشدن کانال‌های کلسیم
 - (۴) بسته شدن کانال‌های کلسیم و بازشدن کانال‌های پتانسیم
- ۱۴- تقسیم‌بندی محدوده (Range fractionation)، در جمعیتی از گیرنده‌های حسی چه کاربردی دارد؟
- (۱) افزایش محدوده دریافت در هر گیرنده
 - (۲) افزایش دقت در تشخیص دادن شدت محرک
 - (۳) کاهش دقت در تشخیص دادن شدت محرک
 - (۴) کاهش سرعت در تشخیص دادن شدت محرک
- ۱۵- در قلب کدام جانور، میزان میوکارد اسفنجی از میوکارد متراکم بیشتر است؟
- (۱) ماهی
 - (۲) خرنده
 - (۳) پرنده
 - (۴) پستاندار
- ۱۶- در تبدیل اسید‌آمینه تیروزین به دوپامین کدام دو آنزیم زیر شرکت دارند؟
- (۱) موتاز - هیدروکسیلاز
 - (۲) دکربوکسیلاز - ترانس آمیناز
 - (۳) هیدروکسیلاز - دکربوکسیلاز
 - (۴) هیدروکسیلاز - دهیدروژناز
- ۱۷- جایگاه اثر کدام ترکیب زیر روی پروتئین با سایر مواد متفاوت است؟
- (۱) گوانیدین هیدروکلراید
 - (۲) بتامرکاپتو اتانول
 - (۳) دی‌تیوتیریتول
 - (۴) یدواستات

- ۱۸ کدام آنزیم در سلول‌های کبدی حضور داشته ولی در عضلات دیده نمی‌شود؟
 ۱) هگزوکیناز
 ۲) گلوکز ۶-فسفات دهیدروژناز
 ۳) پپروات دهیدروژناز
 ۴) گلوکز ۶-فسفات دهیدروژناز
- ۱۹ گالاکتوز و مانوز به ترتیب از طریق تبدیل به کدام حدوات وارد مسیر گلیکولیز می‌شوند؟
 ۱) گلوکز ۱-فسفات و فروکتوز ۶-فسفات
 ۲) گلوکز ۶-فسفات و گلوکز ۱-فسفات
 ۳) فروکتوز ۱ و ۶-بیسفسفات و فروکتوز ۱-فسفات
 ۴) گلوکز ۶-فسفات و فروکتوز ۶-فسفات
- ۲۰ آنزیم استیل کوآکربوکسیلاز به واسطه یک پروتئین توسط فعال می‌شود.
 ۱) فسفاتاز - گلوکاگون ۲) کیناز - انسولین ۳) کیناز - گلوکاگون ۴) فسفاتاز - انسولین
- ۲۱ برای شناسایی گلیکوپروتئین‌ها توسط سلکتین‌ها کدام باقیمانده‌های قندی ضروری است؟
 a. استیل گالاکتوز آمین
 b. گالاکتوز
 c. استیل گلوکز آمین
 d. مانوز
 e. استیل نورامینیک اسید
 f. فوکوز
- b,c,d,e,f (۴) b,c,d,e (۳) a,c,d (۲) e,f (۱)
- ۲۲ کدام عبارت در رابطه با ژنوم میتوکندری درست است?
 ۱) از لحاظ آرایش ژن‌ها در ژنوم شبیه ژنوم هسته می‌باشد.
 ۲) بعضی از کدهای آن با کدهای Universal هم‌خوانی ندارد.
 ۳) بیشتر پروتئین‌های زنجیره تنفسی توسط ژنوم میتوکندری رمزگذاری می‌شود.
 ۴) پروتئین‌های شبیه هیستونی بیشتری در ژنوم میتوکندری نسبت به ژنوم هسته وجود دارد.
- ۲۳ کدام آنتی‌بیوتیک با اتصال به زیر واحد S₅₀، عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز را مهار می‌کند؟
 ۱) استرپتومایسین ۲) سیکلوهگزامید ۳) تتراسایکلین ۴) کلرامفینیکل
- ۲۴ همه جملات زیر در مورد CDK‌های میتوزی درست‌اند، به جز:
 ۱) weel کیناز را فعال می‌کنند.
 ۲) باعث فعال شدن SMC‌ها می‌شوند.
 ۳) باعث فعال‌سازی Cdc25 فسفاتاز می‌شوند.
- ۲۵ همه واکنش‌های زیر مربوط به عملکرد پراکسی‌زوم‌ها می‌باشد، به جز:
 ۱) تولید و حذف H₂O₂
 ۲) متابولیزم ترکیبات نیتروژن‌دار
 ۳) اکسیداسیون اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه
 ۴) کاتابولیسم ترکیبات غیرمعمول مانند اسیدهای آمینه از نوع D
- ۲۶ دوره تحریک‌ناپذیری نسبی در نورون‌هایی که تراکم بالایی از کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ دارند، به علت پتانسیل آستانه، است.
 ۱) افزایش - کوتاه‌تر ۲) افزایش - بلندتر
 ۳) کاهش - کوتاه‌تر ۴) کاهش - بلندتر

- ۲۷- خروج هسته‌های مشبکی فوقانی پل مغزی و مزانسفال از حالت در اثر تخریب منجر به می‌شود.
- ۱) مهار - هسته‌های دسته منزوی - خواب عمیق
 - ۲) مهار - هسته‌های سجافی - بیداری شدید
 - ۳) تحریک - هسته‌های منتشر تalamوس - بیداری شدید
 - ۴) مهار - هسته سوپراکیاسماتیک فوقانی - خواب طولانی
- ۲۸- کدامیک از مکانیسم‌های مولکولی زیر، در ایجاد بیماری هانتینگتون نقش دارد؟
- ۱) مهار نورون‌های گلوتاماترژیک قشر مغز
 - ۲) تحریک نورون‌های گلوتاماترژیک قشر مغز
 - ۳) مهار گابائرژیک نورون‌های دوپامینرژیک در جسم سیاه
 - ۴) رفع مهار گابائرژیک نورون‌های دوپامینرژیک در جسم سیاه
- ۲۹- فعالیت کدامیک از نواحی زیر در دستگاه عصبی مرکزی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تمامی عملکردهای حسی، حرکتی، احساسی، آندوکرینی و هیجانی در بدن تأثیر دارد؟
- ۱) هسته‌های عمقی مخچه
 - ۲) تشکیلات مشبک یا تورینهای
 - ۳) نواحی حسی و حرکتی در قشر مخ
 - ۴) نواحی گیجگاهی و سینگولی در قشر مخ
- ۳۰- پیام‌های حسی چشایی و حسی - پیکری ناحیه سر و صورت، به کدامیک از هسته‌های تalamوسی ارسال می‌شوند؟
- ۱) هسته شکمی عقبی میانی یا VPM Nucleus
 - ۲) هسته شکمی عقبی جانبی یا VPL Nucleus
 - ۳) هسته زانویی میانی یا Medical Geniculate Nucleus
 - ۴) هسته زانویی جانبی یا Lateral Geniculate Nucleus
- ۳۱- تعیین جهت صدا، عمدتاً به وسیله کدام مراکز عصبی صورت می‌گیرد؟
- ۱) قشر گیجگاهی مخ
 - ۲) نورون‌های غشای پایه
 - ۳) کولیکولوس‌های فوقانی
 - ۴) هسته‌های زیتونی فوقانی
- ۳۲- کدامیک از هسته‌های زیر در تشخیص شتاب زاویه‌ای (Angular acceleration) دخالت دارد؟
- ۱) منزوی بصل النخاع
 - ۲) زیتونی بصل النخاع
 - ۳) دهلیزی بصل النخاع
- ۳۳- همزمانی (سنکرونیزاسیون) امواج الکتریکی مغز (EEG)، در کدام حالت بیشتر است؟
- ۱) مرحله اول در شروع خواب
 - ۲) مرحله چهارم خواب non-REM
 - ۳) در طول مراحل خواب REM
 - ۴) در بیداری هنگام پردازش اطلاعات حسی
- ۳۴- ارتباط بین هیپوکامپ و اجسام پستانی هیپوتalamوس در هر نیمکره مخ به وسیله کدام مسیر عصبی برقرار می‌شود؟
- ۱) فورنیکس
 - ۲) جسم پینهای
 - ۳) رابط خلفی یا عقبی
 - ۴) رابط جلویی یا قدمای
- ۳۵- کوتاه شدن زمان دم و افزایش ریتم تنفس به عهده کدامیک از مراکز مغزی زیر است؟
- ۱) هسته دسته منزوی بصل النخاع
 - ۲) مرکز آپنوتیک در بخش پشتی - جانبی پل مغز
 - ۳) مجموعه بوتزنینگر در بخش شکمی ساقه مغز
 - ۴) مرکز پنوموتاکسیک در بخش پشتی - جانبی پل مغز
- ۳۶- تحریک گیرنده‌های NMDA گلوتاماتی در هسته پشتی میانی هیپوتalamوس موش بزرگ آزمایشگاهی باعث می‌شود.
- ۱) چاقی
 - ۲) لاغری مفرط
 - ۳) عرق کردن
 - ۴) برهم‌خوردن تعادل آب بدن

- ۳۷ - کدامیک از هسته‌های زیر، بخش زیادی از مسیر پایین‌رونده کنترل درد را تشکیل می‌دهد؟
- (۱) خاکستری اطراف کanal مغزی (PAG)
 - (۲) مشبك تalamوس (RNT)
 - (۳) بین‌تیغه‌ای تalamوسی (INT)
 - (۴) اکومبنس (NAG)
- ۳۸ - کدامیک از نواحی مغز ارتباطات وسیعی با قشر پیش‌پیشانی برای پردازش یادگیری و حافظه دارند؟
- (۱) تگمنتوم شکمی - هسته اکومبنس - مخچه
 - (۲) هسته رافه - لوکوس سرلئوس - هیپوکامپ
 - (۳) هیپوکامپ پشتی - هسته پشتی میانی تalamوس - آمیگدال
 - (۴) هیپوکامپ پشتی - هسته زانوبی میانی تalamوس - لوکوس سرلئوس
- ۳۹ - کدامیک از هسته‌های عصبی در بصل النخاع پیام‌های حسی پاها را به نواحی مغزی بالاتر رله و ارسال می‌کند؟
- (۱) کونٹاٹ
 - (۲) گراسیل
 - (۳) پشتی واگ
 - (۴) دسته منزوی
- ۴۰ - کدام هسته عصبی در مغز میانی واقع شده است و در انعکاس یا بازتاب تغییر تحدب عدسي چشم نقش مهمی دارد؟
- (۱) ادینگر - وستفال
 - (۲) عصب تروکلثار
 - (۳) دندانهای
 - (۴) بینابینی
- ۴۱ - بیشتر آکسون‌های مسیر حرکتی هرمی (Pyramidal pathway) یا مسیر قشری نخاعی، از داخل کدامیک از ستون‌های ماده سفید نخاع پایین می‌روند؟
- (۱) شکمی یا جلویی
 - (۲) پشتی یا عقبی
 - (۳) جانبی
 - (۴) مرکزی
- ۴۲ - کدامیک از سلول‌های زیر، در مخچه دارای انتقال‌دهنده عصبی تحریکی است؟
- (۱) پورکینژ
 - (۲) دانه‌دار
 - (۳) سبدی
 - (۴) گلزی
- ۴۳ - کدام نوروگلیا در کنترل ورود و خروج آب به نورون‌ها نقش مهمی دارد؟
- (۱) اپاندیما
 - (۲) میکروگلیاها
 - (۳) آستروروسیت‌ها
 - (۴) الیگودندروروسیت‌ها
- ۴۴ - کدام گزینه در رابطه با سیستم کولینرژیک مغز صحیح است؟
- (۱) فعال شدن استیل کولین استراز منجر به فعال شدن طولانی سیناپس می‌شود.
 - (۲) فعال شدن گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک منجر به EPSP پس‌سیناپسی می‌شود.
 - (۳) گیرنده‌های یونوتروپیک پاسخ‌های ماندگارتری نسبت به متابوتروپیک ایجاد می‌کنند.
 - (۴) گیرنده‌های متابوتروپیک کولینرژیک قادر به ایجاد پاسخ‌های EPSP و یا IPSP هستند.
- ۴۵ - کدام جفت از اعصاب مغزی از بخش پشتی ساقه مغز خارج می‌شود؟
- (۱) اشتیاقی
 - (۲) شوکی
 - (۳) حرکتی مشترک چشم
 - (۴) حرکتی خارجی چشم
- ۴۶ - در سلول‌های استوانه‌ای شبکیه چشم در سلول‌های استوانه‌ای شبکیه چشم
- (۱) در زمان روشنایی، یون‌های سدیم از طریق کanal‌های نشته سدیم از قطعه خارجی سلول خارج می‌شوند.
 - (۲) در شرایط تاریکی، با فعال شدن آنزیم GMP فسفاتاز، یون سدیم وارد قطعه خارجی می‌شود.
 - (۳) با تغییر شرایط روشنایی به تاریکی، درجه هیبریلاریزاسیون در این سلول‌ها افزایش می‌یابد.
 - (۴) در شرایط تاریکی، الکترونگاتیویته سلول روند کاهشی دارد.
- ۴۷ - در صورت تحریب تارهای Ia عضلانی، کدام ویژگی درست است؟
- (۱) بازتاب کششی معکوس وجود ندارد.
 - (۲) بازتاب کششی تا حدی وجود دارد.
 - (۳) بازتاب‌ها طبیعی، اما انقباض ارادی عضله وجود ندارد.
 - (۴) هیچ‌گونه بازتاب کششی در عضله انجام نمی‌شود.

- ۴۸- فیبرهای بالارونده و خزهای مخچه چه نقش مشترکی دارند؟

۱) تحریک هسته‌های عمقی مخچه

۲) سلول‌های پورکینژ در پاسخ به تحریک آنها به ترتیب فعال و غیرفعال می‌شوند.

۳) هر دو با تعداد سیناپس‌های مشابه، پورکینژها را به ترتیب تحریک و مهار می‌کنند.

۴) هر دو منشأ مشترکی داشته و ضمن عبور از مغز میانی و نخاع آلفا موتور نورون‌ها را مهار می‌کنند.

- ۴۹- تخریب کدام ساختار منجر به سختی عضلانی (افزايش تonus) می‌شود؟

۱) نورون‌های دوپامینی تگمنتم شکمی

۲) نورون‌های مهاری تالاموس شکمی

۳) نورون‌های دوپامینی جسم سیاه

۴) نورون‌های مهاری ساقه مغز

- ۵۰- گیرنده‌های کولینرژیک در سیستم عصبی خودمختار در کجا قرار گرفته‌اند؟

۱) روی اندام پاسخ‌دهنده سمپاتیک

۲) روی اندام‌های پاسخ‌دهنده سمپاتیک و پاراسمپاتیک

۳) تنها روی نورون‌های پس‌گره پاراسمپاتیک

- ۵۱- کدام گزینه در ارتباط با پورین‌ها صحیح است؟

۱) حاوی گیرنده‌های اختصاصی متصل به کانال یونی هستند.

۲) وزیکول‌های حاوی پورین‌ها در سرتاسر پایانه سیناپس شیمیایی حضور دارند.

۳) علاوه‌بر سیناپس‌های شیمیایی در سیناپس‌های الکتریکی نیز نقش دارند.

۴) ماده P از دسته پورین‌ها است و به عنوان نوروترانسミتر و کوترانسミتر عمل می‌کند.

- ۵۲- پس از اتصال اپی‌نفرین با گیرنده‌های β_1 -آدرنرژیک در کار دیومیستها، کدام مورد اتفاق نمی‌افتد؟

۱) مسیر انتقال پیام وابسته به cAMP فعال می‌شود.

۲) با فسفریله‌شدن میوزین، سرعت چرخه پل عرضی زیاد می‌شود.

۳) فسفریله‌شدن پروتئین‌های غشای شبکه سارکوپلاسمی، رهاسازی کلسیم را به سیتوپلاسم افزایش می‌دهد.

۴) فسفریله‌شدن کانال‌های پتاسیمی شبکه سارکوپلاسمی، موجب کاهش بازجذب یون کلسیم به شبکه سارکوپلاسمی می‌شود.

- ۵۳- فعالیت کدام‌یک از گیرنده‌های زیر باعث جربانات کلسیمی و القاء پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی می‌شود؟

Cannabinoid CB1 (۱) $\alpha_3\beta_2nAch$ (۲) α_7nAch (۳) $5HT_{1A}$ (۴)

- ۵۴- کدام گیرنده نوروترانسミتری زیر از نوع گیرنده‌های یون‌تروپیک است که در نخاع بیشتر وجود دارد و با عبور دادن یون کلر موجب مهار سلول می‌شود؟

۱) گلایسین (۲) گابا نوع B (۳) دوپامینی نوع D2 (۴) نیکوتینی استیل کولین

- ۵۵- کیناز زنجیره سبک میوزین، از چه طریقی سبب بروز اثرات فیزیولوژیک می‌شود؟

(۱) IP₃ و DAG (۲) PDE (۳) فسفریلاسیون گروههای تیروزین

۴) فسفریلاسیون گروههای سرین - ترئونین

- ۵۶- پیام‌سانی سلولی نیتریک اکساید، عمدتاً از طریق کدام مسیر صورت می‌گیرد؟

(۱) گوانیلیل سیکلаз محلول یا سیتوزولی (۲) گوانیلیل سیکلاز غشائی

(۳) آدنیلیل سیکلاز (۴) تیروزین کینازی

- ۵۷- سیستم‌های حسی، کدام موارد را کدگذاری می‌کنند؟

(۱) حساسیت، تمیز، انرژی و تصویر شدن (۲) آستانه، موقعیت، احساس و طول مدت تحریک

(۳) مودالیته، محل قرارگیری، شدت و طول مدت تحریک (۴) آستانه، میدان گیرنده‌گی، سازش‌پذیری و تمیز

-۵۸- گیرنده α_1 آدرنرژیکی نوراپی‌نفرین، توسط کدام پیک ثانویه زیر موجب بروز اثرات داخل سلولی می‌شود؟

- (۱) کاهش DAG و IP₃
- (۲) افزایش DAG و cAMP
- (۳) افزایش cAMP
- (۴) کاهش cAMP

-۵۹- از کدام روش می‌توان برای تعیین فراتنظیمی گیرنده‌های دوبامینی در غشای نورون‌های هسته اکومبنس استفاده کرد؟

- (۱) پچ کلامپ
- (۲) وسترن بلاط
- (۳) ایمنوهیستوشیمی
- (۴) RT - پی‌سی‌آر

-۶۰- گیرنده‌های عوامل متابولیک، فاکتورهای رشد و سایتوكین‌ها از چه نوعی هستند؟

- (۱) کاتالیتیک (Enzyme-linked)

(۲) هسته‌ای (Nuclear)

(۳) سیتوپلاسمی (Cytoplasmic)

(۴) متصل‌شونده به پروتئین جی (G-protein coupled)

-۶۱- کدامیک از عوامل زیر لیگاند اصلی آندوزن گیرنده CB2 محسوب می‌شوند؟

- (۱) دینورفین
- (۲) آناندامید
- (۳) تراهیدروکانابینول
- (۴) پالمیتویل اتانول آمین

-۶۲- کدامیک از گیرنده‌های زیر به G-پروتئین هتروتریمری متصل است؟

- (۱) استیل کولین در محل اتصال عصب - عضله
- (۲) گلیسین
- (۳) GABA_B
- (۴) 5-HT₃

-۶۳- گیرنده متصل به G-پروتئین تحریکی، کدام نقش زیر را ایفا می‌کند؟

- (۱) صرفاً پیام لیگاند را به G پروتئین منتقل می‌کند.
- (۲) به عنوان فاکتور تعویض نوکلئوتید گوانین (GEF) عمل می‌کند.
- (۳) به عنوان پروتئین فعال کننده GAP (GTPase) عمل می‌کند.
- (۴) به عنوان فاکتور تنظیم کننده پیامرسانی G پروتئین (RAS) عمل می‌کند.

-۶۴- با اتصال استیل کولین به گیرنده خود در گره پیشا亨نگ چه اتفاقی می‌افتد؟

- (۱) اتصال زیروحد بتاگاما (βγ) به کanal پتاسیم
- (۲) اتصال زیروحد بتاگاما (βγ) به کanal کلسیم
- (۳) فعال شدن زیروحد آلفا اس (αS) و دفسفریله شدن کanal پتاسیم
- (۴) فعال شدن زیروحد آلفا اس (αS) و دفسفریله شدن کanal کلسیم

-۶۵- در مورد نقش کanal‌ها در پتانسیل‌های مختلف ایجادشده در غشای سلول‌های عصبی، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) فقط کanal‌های حساس به ولتاژ، در ایجاد پتانسیل‌های زیرآستانه نقش دارند.

(۲) کanal‌های نشتی و کanal‌های دریچه‌دار حساس به ولتاژ در تولید پتانسیل استراحت و پتانسیل آستانه نقش دارند.

(۳) انواع کanal‌های دریچه‌دار حساس به لیگاند، حساس به کشش و حساس به ولتاژ در ایجاد پتانسیل عمل نقش دارند.

(۴) انواع کanal‌های دریچه‌دار حساس به لیگاند، حساس به کشش و حساس به ولتاژ در ایجاد پتانسیل‌های زیرآستانه نقش دارند.

-۶۶- کدام نوع از گیرنده‌های انتقال‌دهنده‌های عصبی دارای سه زیروحد بوده و از نوع یونوتروپیک است؟

- (۱) گلوتامات نوع AMPA
- (۲) گابا نوع GABA_B
- (۳) پورینی نوع P2X
- (۴) پورینی نوع P2Y

-۶۷- وجود EAAT از مختصات غشای پیش و پس‌سیناپسی کدام ناقل است؟

- (۱) دوبامین
- (۲) گلوتامات
- (۳) سروتونین
- (۴) استیل کولین

- ۶۸ مهم‌ترین مکانیسم انتقال LDL از غشا کدام است؟
- (۱) کاونولین‌ها (Caveolins)
 - (۲) قایق‌های لیپیدی (Lipid rafts)
 - (۳) حامل‌های غشایی (Transmembrane Carriers)
 - (۴) اندوسیتوز وابسته به گیرنده غشایی (Receptor-mediated endocytosis)
- ۶۹ کدام یک از فسفولیپیدهای غشایی بیشتر در سطح سیتوپلاسمی غشا قرار دارد و پیش‌سازی برای تولید پیک‌های ثانویه است؟
- (۱) فسفاتیدیل سرین
 - (۲) فسفاتیدیل اینوزیتول
 - (۳) فسفاتیدیل اتانول آمین
 - (۴) فسفاتیدیل کولین
- ۷۰ کدام نوع از اتصالات سلولی بین سلول‌های پوششی روده در بالاترین سطح نزدیک به غشای رأسی سلول قرار دارد؟
- (۱) دسموزوم‌ها (Desmosomes)
 - (۲) اتصالات محکم (Tight Junctions)
 - (۳) اتصالات شکافدار (Gap Junctions)
 - (۴) اتصالات چسبنده (Adherents Junctions)
- ۷۱ تارهای عصبی گروه A زمان نهفته بیشتری نسبت به گروه B دارند.
- (۱) دلتا زمان نهفته کمتری نسبت به گروه A آلفا دارند.
 - (۲) آستانه تحريك‌پذيری بيشتری نسبت به گروه A دارند.
 - (۳) آستانه تحريك‌پذيری بيشتری نسبت به گروه B دارند.
 - (۴) آستانه تحريك‌پذيری بيشتری نسبت به گروه A دارند.
- ۷۲ عدم فعالیت GTPase در G پروتئین‌های پوشش وزیکول‌هایی که به سمت غشای هدف می‌روند، چه پیامدی دارد؟
- (۱) الحق وزیکول به غشای هدف اتفاق نمی‌افتد.
 - (۲) جدا شدن جوانه‌های وزیکولی اتفاق نمی‌افتد.
 - (۳) پوشش وزیکولی تشکیل نمی‌شود.
 - (۴) پوشش وزیکولی تجزیه می‌شود.
- ۷۳ اتصال ATP به کanal حساس به این مولکول در سلول بتای پانکراس چه نتیجه‌ای در پی دارد؟
- (۱) دپولاریزه شدن غشا و مهار ترشح انسولین
 - (۲) دپولاریزه شدن غشا و تحريك ترشح انسولین
 - (۳) هایپرپلاریزه شدن غشا و تحريك ترشح انسولین
 - (۴) هایپرپلاریزه شدن غشا و مهار ترشح انسولین
- ۷۴ کدام گزینه از ويزگی‌های پیک‌های پیتیدی است؟
- (۱) نیمه‌عمری طولانی و بیشتر از ۲۴ ساعت دارند.
 - (۲) گیرنده‌های عرض غشایی و درون‌هسته‌ای دارند.
 - (۳) معمولاً به وسیله آنزیم‌های پروتئولیتیک تجزیه و از مایعات خارج سلولی حذف می‌شوند.
 - (۴) به محض سنتز به آسانی از عرض غشای عبور می‌کنند و در مایعات خارج سلولی حل می‌شوند.
- ۷۵ کدام ترانسپورتر در انتقال گلوکز از سلول‌های اپی‌تليال بخش انتهایی توبول پروگزیمال، به مایع بین‌سلولی نقش دارد؟
- (۱) SGLT₂
 - (۲) GLUT₂
 - (۳) SGLT₁
 - (۴) GLUT₁
- ۷۶ کanal‌های کلسيمي نوع T در ايجاد کدام مرحله نقش دارند؟
- (۱) مرحله دپولاريزاسيون در فيبرهای پورکنژ
 - (۲) مرحله پیش‌پتانسیل در گره سینوسی دهليزي
 - (۳) مرحله دپولاريزاسيون در گره سینوسی دهليزي
 - (۴) مرحله کفه در منحنی پتانسیل عمل سلول‌های بطنی
- ۷۷ کدام گیرنده در القای برادي‌کاردی تحت تأثير پاراسمپاتيك نقش دارد؟
- (۱) α₁
 - (۲) M₁
 - (۳) M₂
 - (۴) M₃

- ۷۸ - کدامیک از عوامل زیر در پدیده انتقال وزیکول غشایی در محل سیناپس، نقش ندارد؟
- Ras (۴) Rab-3 (۳) Syntaxin (۲) Synaptobrevin (۱)
- ۷۹ - مسیر پیامرسانی داخل سلولی کدامیک از عوامل زیر، از طریق cAMP می‌باشد؟
- ۴) اندولین (۴) NO (۳) ANP (۲) ACTH (۱)
- ۸۰ - در مورد پیامرسانی فاکتور رشد اندولیال رگی، کدام جمله صحیح است؟
- (۱) آبشار فسفریلاسیون تیروزینی را فعال می‌کنند و باعث دایمیریزاسیون گیرنده‌ای می‌شوند.
- (۲) به گیرنده‌های سرین - ترئونین کینازی متصل می‌شوند و پروتئین CREB را فعال می‌کنند.
- (۳) گیرنده‌های G-پروتئینی هترومریک را فعال می‌کنند و باعث افزایش cAMP می‌شوند.
- (۴) به گیرنده‌های تیروزین کینازی متصل می‌شوند و پروتئین Ras را فعال می‌کنند.

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1402

تیری سال 1402

و اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ 24/12/1401 با مراجعه به سامانه پاسخگویی بینرنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات" / "آزمون دکتری سال 1402" اقدام نمایید.
ازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مكتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی	F	1	علوم پایه

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	4	31	4	61	4
2	2	32	3	62	3
3	1	33	2	63	2
4	3	34	1	64	1
5	4	35	4	65	4
6	1	36	1	66	3
7	2	37	1	67	2
8	3	38	3	68	4
9	1	39	2	69	3
10	4	40	1	70	2
11	2	41	3	71	3
12	3	42	2	72	1
13	4	43	3	73	2
14	2	44	4	74	3
15	1	45	1	75	4
16	3	46	4	76	2
17	1	47	2	77	3
18	2	48	1	78	4
19	4	49	3	79	1
20	4	50	4	80	4
21	1	51	1		
22	2	52	4		
23	4	53	2		
24	1	54	1		
25	3	55	4		
26	3	56	1		
27	2	57	3		
28	4	58	2		
29	2	59	3		
30	1	60	1		

خروج